

ESTÍMULOS VERBALES Y TRASTORNOS EMOCIONALES: UN ESTUDIO SOBRE PALABRAS CON CONTENIDO EMOCIONAL

M.Teresa Blanch¹ y Rosa M.Baños²

¹Unidad de Salud Mental de Altavix-Elx (Alicante)

y ²Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos,
Universitat de València.

RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo fundamental el proporcionar datos normativos sobre un listado de palabras que pueda ser utilizado por los investigadores interesados en el estudio cognitivo de los trastornos emocionales. Se analizan datos relativos a la frecuencia subjetiva de uso de las palabras que normalmente se usan en estos estudios, en qué medida estas palabras se relacionan con ansiedad y con depresión, hasta qué punto son comprendidas por los sujetos, y en qué grado pueden evocar una imagen. Además, se ofrecen resultados sobre las diferencias en estas categorías en función del sexo, ser o no psicólogo/a, la edad y el nivel educativo.

Creemos que este trabajo puede ser de cierta utilidad para los investigadores interesados en el estudio experimental de los factores cognitivos involucrados en los trastornos emocionales, aportando información que a veces no es fácil obtener, pero que supone un paso preliminar para seleccionar el material estimular necesario en diversos paradigmas experimentales.

PALABRAS CLAVE: frecuencia de uso, familiaridad, trastornos emocionales, sesgos cognitivos, palabras emocionales.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to provide normative data of emotional words that can be used by researchers interested in cognitive aspects of emotional disorders. We provide data on word frequency, comprehension, imaginability and the degree to which these words are related to anxiety and depression. Besides, we analysed differences on these variables with respect to sex, age, cultural level and lay/expert in psychology.

We hope this study could be useful for researchers interested in experimental investigation of cognitive bias in emotional disorders. This paper provides information no easily available in our language, which is relevant to be used as verbal stimuli in cognitive-emotional experimental tasks.

KEY WORDS: word frequency, familiarity, emotional disorders, cognitive biases, emotional words.

INTRODUCCIÓN

El estudio de la ansiedad y la depresión ha interesado siempre a los psicólogos y psiquiatras, quienes para explicar estos fenómenos han utilizado mecanismos muy diversos. Desde hace ya varios años, uno de los acercamientos psicológicos que más atención está recibiendo por parte de los investigadores es el que parte de la teoría del procesamiento de la información (MacLeod y Mathews, 1991). Son muchos los autores y teorías que existen dentro de esta perspectiva. En general, podríamos decir que todos ellos compartirían el supuesto básico de que los trastornos emocionales están causados o mantenidos por distorsiones y/o sesgos cognitivos (Eysenck, 1992). Con el fin de comprobar las distintas hipótesis sobre el papel de los factores cognitivos en estos trastornos, se han utilizado diversas perspectivas metodológicas. Así, muchos de los estudios realizados han utilizado fundamentalmente técnicas de auto-informe con el fin de investigar creencias, expectativas, actitudes, etc., pudiéndose encuadrar dentro de lo que Brewin (1988) y Belloch e Ibáñez (1991) denominan psicología cognitiva social y de la personalidad. Sin embargo, otros estudios se han decantado por la utilización de tareas de laboratorio para investigar procesos, operaciones y estructuras cognitivas, encuadrándose en este caso dentro la perspectiva denominada psicología cognitiva experimental (Belloch e Ibáñez, 1991; Brewin, 1988). Dentro de este último enfoque, se han aplicado diversas tareas experimentales, como la escucha dicótica, la versión modificada del paradigma Stroop, la tarea de detección de puntos, la decisión léxica, palabras homófonas, tareas de autoadscripción de rasgos, tareas de memoria implícita, etc.

La mayoría de estas tareas experimentales utilizan palabras de diverso contenido emocional como material estimular. Una cuestión importante es cómo seleccionar estas palabras, ya que tendrían que cumplir una serie de requisitos metodológicos a la par que poseer significación o valencia emocional relevante para el trastorno objeto de estudio. Para atender a la significación o valencia emocional se suelen utilizar palabras extraídas de cuestionarios, de estudios sobre emociones, etc., que luego son valoradas siguiendo dos estrategias

diferentes. La primera de ellas consiste en utilizar amplias muestras de sujetos (generalmente estudiantes universitarios o pacientes clínicos), a los que se pide que examinen las palabras en función de su valor autodescriptivo (p.ej., Gotlib y Cane, 1987; Greenberg, Vázquez y Alloy 1988; Sanz, 1994). La segunda estrategia consiste en utilizar el criterio de varios jueces expertos para clasificar las palabras, atendiendo a distintas categorías (p.ej., relacionadas con amenaza social, con amenaza física, con depresión, etc.) (p.ej., Mathews y Klug, 1993; Mogg, Bradley, Williams y Mathews, 1993). Sin embargo, existen pocos estudios que realicen este trabajo; lo más habitual es que los autores tomen las palabras de otros artículos ya publicados. Así, por ejemplo, en el caso de nuestro idioma, normalmente se han traducido las palabras utilizadas en otros trabajos anglosajones. Esta estrategia puede acarrear ciertas amenazas a la validez de los resultados. Por ejemplo, puede que existan diferencias culturales entre las poblaciones de habla inglesa y habla española en cuanto a los términos concretos que utilizan para denominar rasgos de personalidad (Sanz, 1994), estados de ánimo, o situaciones y objetos emocionales.

En cuanto a los requisitos metodológicos, las palabras normalmente se han de balancear teniendo en cuenta el número de letras, el número de sílabas, la frecuencia de uso, la imaginabilidad, la familiaridad, el número de significados alternativos, etc. Sin embargo, normalmente se atiende exclusivamente a la longitud de las palabras y a la frecuencia de uso. Para cumplir el requisito de la frecuencia de uso existen algunos diccionarios de palabras inglesas diseñados para tal fin, siendo los más usados los de Carroll, Davies y Richman (1971), Kucera y Francis (1967), y Roget (1962). Sin embargo, en el caso del idioma castellano, sólo contamos con el diccionario de Juilland y Chang Rodríguez (1964) y, desgraciadamente, este trabajo cuenta con algunos inconvenientes. Primero, la necesidad de una actualización de la base de datos, ya que muy probablemente el uso de las palabras haya variado en estos últimos 30 años. Segundo, y con respecto al estudio de los trastornos emocionales, este diccionario no contiene información sobre las palabras

relevantes en el estudio de estos trastornos. Esta limitación tiene repercusiones importantes a la hora de realizar investigaciones sobre este tópico. Por ejemplo, en un estudio sobre auto-esquemas depresivos y ansiosos, Sanz (1994) no pudo controlar la frecuencia de uso de los adjetivos que utilizaba, porque en este diccionario sólo se encontraba el 39% de los estímulos que necesitaba. Esto mismo nos ha ocurrido también a nosotras cuando, al diseñar estudios sobre sesgos cognitivos en trastornos de ansiedad y depresión, nos hemos encontrado con la imposibilidad de conocer la frecuencia de uso de aquellas palabras que los jueces expertos señalaban como relevantes para estos pacientes.

Pero, además de la frecuencia de uso, las tareas experimentales suelen exigir que se controlen otras variables como la emocionalidad, la imaginabilidad o la comprensibilidad de una palabra. La literatura al respecto señala que estas variables pueden afectar de manera importante a la realización de las tareas (p.ej., Campos y González, 1991; Graves, Landis y Goodglass, 1981; MacLeod, 1991; Martin, Williams y Clark, 1991; Paivio, 1971; Pascual, 1984). Sin embargo, como señala Sanz (1994), la mayoría de las investigaciones en español sobre trastornos emocionales que utilizan material verbal, suelen tener como deficiencia el pobre o nulo control sobre estas características de las palabras. Y esto podría afectar de un modo importante a la validez de los resultados obtenidos en estos estudios, ya que estas características de los estímulos verbales podrían actuar como variables extrañas que, al no ser controladas, oscurecerían la interpretación de los resultados.

Precisamente, el objetivo fundamental del presente trabajo es el de proporcionar datos normativos sobre un listado de palabras que pueda ser utilizado por los investigadores interesados en la psicopatología de los trastornos emocionales. Para ello, hemos analizando cuál es la frecuencia subjetiva de uso de las palabras que normalmente se usan en estos estudios, en qué medida estas palabras se relacionan con ansiedad y con depresión, hasta qué punto son comprendidas por los sujetos, y en qué grado pueden evocar una imagen. Por último, estamos interesados en saber si existen diferencias en estas catego-

rias en función del sexo, entre los psicólogos y los no psicólogos, entre los diferentes grupos de edad y entre los distintos niveles de estudios.

METODO

Sujetos

La muestra estaba compuesta por 212 sujetos, de los cuales 160 eran mujeres y 52 varones. El rango de edad oscilaba entre 17 y 63 años, siendo la edad media de 34,40 años y la desviación típica de 9,17. Para análisis posteriores esta muestra fue dividida en 3 grupos de acuerdo con la edad: entre 17 y 24 años (N=111), entre 25 y 40 años (N=57) y entre 41 y 73 años (N=34). En cuanto a los estudios, contamos con 16 personas con estudios elementales, 84 con estudios medios y 112 con estudios superiores. El 45,7% de la muestra eran psicólogos, o estaban en el último curso de sus estudios de psicología; mientras que el 54,3% restante no eran psicólogos, ni cursaban estudios de Psicología.

Material y procedimiento

Se construyó un listado de 125 palabras que se suelen utilizar en tareas experimentales sobre trastornos emocionales. Para seleccionar estas palabras se utilizaron dos fuentes diferentes. En primer lugar, se revisaron los listados de palabras incluidos en los artículos publicados en la literatura (tanto en lengua inglesa como española); hay que señalar, a este respecto, que en algunos de los artículos que utilizan material verbal, aunque se describe el tipo de estímulos empleados, no se incluye el listado específico de tales palabras o, en otros casos, se remiten al material utilizado por otros autores. En segundo lugar, se utilizaron los siguientes cuestionarios de ansiedad y depresión: el "Inventario de Depresión de Beck" (B.D.I.), la "Escala de Valoración Psiquiátrica de Hamilton para la Depresión", la "Escala de Auto-Calificación de Zung para la Depresión", el "Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo" de Spielberger (S.T.A.I. E.-R), el "Inventario de Ansiedad de Beck" (B.A.I.), la "Escala de Valoración de la Ansiedad de Hamilton", la "Escala de Ansiedad Manifiesta" de Taylor (M.A.S.), el "Cuestiona-

rio de Ansiedad Cognitivo-Somática" de Schwartz et al. (C.S.A.Q.) y el "Hospital Anxiety and Depression Scale" de Zigmond y Snaith (H.A.D.). A partir de estas fuentes se seleccionaron aquellas palabras que parecían cubrir, al menos en gran parte, el campo de las emociones de ansiedad y de depresión, descartando aquellas palabras que eran exclusivas de un único subtipo de estos trastornos (por ejemplo, se descartaron palabras como hospital o ataque, que podrían ser amenazantes o emocionales exclusivamente para los sujetos con trastorno de angustia, o palabras sólo relacionadas con el contenido de obsesiones específicas, etc.).

Las palabras incluidas en el listado fueron ordenadas al azar para cada sujeto, de forma que no influyeran en el resultado factores como el cansancio de los sujetos. La tarea del sujeto consistía en señalar con una cruz de 0 a 10 (siendo 0=Nada y 10=Totalmente) el grado en que:

- el sujeto creía que esa palabra estaba relacionada con ansiedad;
- el sujeto creía que esa palabra estaba relacionada con depresión;
- el sujeto comprendía la palabra;
- la palabra podía evocarle una imagen; y, por último,
- con qué frecuencia el sujeto utilizaba cada una de las palabras.

RESULTADOS

En primer lugar hallamos la media y la desviación típica para cada una de las palabras en las cinco categorías de evaluación, a partir de las puntuaciones dadas por la muestra total. Estos resultados se encuentran en el Anexo 1.

En segundo lugar aplicamos diversas pruebas "t" de Student para muestras independientes, con el fin de analizar las posibles diferencias entre varones y mujeres y entre ser o no psicólogo, en el uso, comprensión, imaginabilidad y relación con ansiedad y depresión de las palabras. Para analizar las posibles diferencias debidas a la edad, dividimos la muestra en tres grupos: sujetos entre los 17 y los 24 años, sujetos entre los 25 y los 40 años y sujetos entre 41 y 73 años. Posteriormente, se aplicaron diversos análisis

de varianza unifactoriales para los tres grupos de edad para cada una de las palabras y las categorías. Para analizar las diferencias debidas al nivel de estudios, también dividimos la muestra en tres grupos: estudios elementales, estudios medios y estudios superiores. Las medias correspondientes a cada subdivisión de la muestra se encuentran en el Anexo 1, donde también se indica la presencia o no de diferencias significativas entre los grupos, tras aplicar los análisis estadísticos que acabamos de indicar.

Por último, también estábamos interesadas en saber si las palabras utilizadas diferían significativamente en su pertenencia a las dos categorías emocionales estudiadas (ansiedad y depresión). Para ello, aplicando la totalidad de la muestra, aplicamos diversas pruebas de "t" de Student para muestras relacionadas. En el Anexo 2 se ofrece el listado tanto de las palabras para las que se han encontrado diferencias significativas, como las que no discriminan entre ambas emociones.

DISCUSIÓN

Las palabras, en general, se suelen utilizar como estímulos en un amplio número de tareas experimentales diseñadas para evaluar procesos psicológicos básicos (atención, percepción, etc.), estructuras cognitivas (autoesquemas, nodos de memoria, etc.), operaciones cognitivas (activación, facilitación, elaboración, etc.), etc. Este tipo de tareas se está utilizando cada vez más en el estudio sobre el funcionamiento cognitivo de los individuos con trastornos emocionales. Así, en estos últimos años estamos asistiendo a una gran proliferación de publicaciones sobre el rendimiento de estos sujetos en tareas como el Stroop modificado, tareas de memoria implícita y explícita, de detección de puntos, de autoadscripción de rasgos, de deletreo de homófonos, etc. En todas estas tareas es un requisito imprescindible el poder controlar determinadas variables de los estímulos verbales que se presentan. Nadie duda, por ejemplo, de la necesidad de equiparar la longitud de las palabras en una tarea de percepción subliminal, o de controlar la frecuencia de uso en una tarea de aprendizaje incidental. Qué variables concretas son las que se debe tener

en cuenta dependerá de la naturaleza específica de la tarea experimental que se utilice. En general, se podría decir que la longitud, la frecuencia de uso, la imaginabilidad y la emocionalidad son las variables que la literatura suele señalar como relevantes en la mayoría de las tareas experimentales que se utilizan en el estudio de los trastornos emocionales. Los autores de lengua anglosajona cuentan con la ventaja de poseer un mayor número de diccionarios que oferten medidas de estas variables. Sin embargo, y como ya hemos señalado, en el idioma castellano no contamos apenas con estudios que analicen bases de palabras y aporten una baremación; y los que hay, como es el caso de Juilland y Chang-Rodríguez (1964) y Algarabel, Ruíz y Sanmartín (1988), no cubren totalmente el campo de las palabras "emocionales". El único trabajo que hemos encontrado en este sentido (Sanz, 1994) analiza palabras que son descriptivos de personalidad. Sin embargo, a veces el tipo de hipótesis que se plantea exige utilizar palabras que no sean adjetivos autodescriptivos, sino sustantivos, verbos, etc., cuyo contenido sea relevante para alguno de los trastornos emocionales. Por ejemplo, la palabra palpitación puede ser una palabra de contenido amenazante para un paciente con trastorno de pánico. Consideramos que es necesario contar con estudios en español sobre las características de estas palabras, ya que a veces su ausencia impide conocer y controlar variables tan importantes para el experimentador como la frecuencia de uso de los estímulos verbales. Y, precisamente, esa es la aportación del trabajo que aquí se presenta.

Obviamente, este trabajo es muy limitado ya que, por ejemplo, no oferta datos sobre palabras "neutras", necesarias en muchos estudios como estímulos controles, ni sobre palabras "específicas" de algunos trastornos (por ejemplo, suciedad, hospital, gente, etc.). Tampoco se ofertan datos sobre otras variables que podrían ser relevantes como "emocionalidad en general", "familiaridad", "diferentes significados posibles", etc. Por otro lado, somos plenamente conscientes de que la "frecuencia de uso" que se utiliza en este estudio no deja de ser una "frecuencia subjetiva de uso", ya que lo que se le pidió a los sujetos es que estimaran en qué grado consideraban

que utilizaban esa palabra. Obviamente, a la hora de estimar la frecuencia de uso de un estímulo verbal existen otros métodos más rigurosos y precisos, como el vaciado de la literatura impresa en una lengua (utilizado por Juilland y Chang-Rodríguez), o el análisis del lenguaje televisivo, etc. Consideramos que tales análisis deberían hacerse y actualizarse periódicamente, sin embargo, tales metodologías excedían con creces los medios y propósitos de nuestro trabajo, donde sólo pretendemos hacer una pequeña aportación a un campo restringido de estímulos verbales: las palabras emocionales.

Por otro lado, este estudio pone de manifiesto las diferencias existentes en el uso, comprensión, imaginabilidad y emocionalidad de las palabras, en función de las características específicas de la muestra. Hemos encontrado que existen muchas diferencias en las cinco categorías en función de si el sujeto es psicólogo o no lo es. Parece que los psicólogos usan con más frecuencia estas palabras, las comprenden mejor, pueden evocar con mayor facilidad imágenes y las consideran más emocionales. Por tanto, aquellos estudios que utilizan sujetos procedentes de últimos cursos de Psicología deberían tener en cuenta estas observaciones. Además, esto también indicaría que cuando se trabaja con sujetos no psicólogos y no universitarios (como lo son la mayoría de los pacientes con trastornos emocionales) a la mejor no es muy conveniente utilizar exactamente el mismo material o, si se hace, se deben controlar las diferencias en estas variables. También hemos encontrado que las mujeres, en general, utilizan con más frecuencia algunas de las palabras emocionales estudiadas (en concreto 21 palabras), no habiendo substanciales diferencias para las otras categorías entre varones y mujeres. No tenemos una explicación concluyente para este resultado, aunque pensamos que quizás las diferencias educativas en cuanto a la expresión de emociones podrían ser responsables, al menos en parte, del mayor uso de palabras emocionales de las mujeres. Por lo que respecta a la edad de los sujetos, los individuos más mayores suelen utilizar con más frecuencia muchas de las palabras estudiadas, aunque son los jóvenes quienes más las relacionan con contenido emocional, especialmente

con ansiedad. Por último, en cuanto al nivel de estudios, hemos encontrado muchas diferencias en todas las dimensiones, siendo el grupo con estudios superiores el más destacado en todas las categorías. Otro aspecto que consideramos especialmente interesante es saber hasta qué punto las palabras valoradas como emocionales pueden utilizarse indistintamente en estudios sobre depresión y sobre ansiedad. En este sentido, hemos encontrado que algunas de ellas parecen discriminar entre ambos tipos de emociones. Este aspecto es importante ya que algunos estudios (p.ej., Mathews y MacLeod, 1985; Tata et al., 1996) intentan discriminar si el rendimiento diferencial de los pacientes con trastornos emocionales en algunas tareas experimentales se produce porque los estímulos utilizados son emocionales, o si los estímulos verbales deben denotar un contenido emocional concreto para que se produzca esta ejecución diferencial. Aunque algunos autores, como por ejemplo McNally et al. (1994), han señalado que a la hora de estudiar un determinado trastorno emocional sería recomendable hacer una selección idiográfica de los estímulos, que asegure la relevancia emocional para cada sujeto, sin embargo, incluso en este caso, siempre sería conveniente el poder contar con un banco inicial de palabras que indique la emocionalidad general de esos estímulos e, incluso, que pueda discriminar entre emociones.

En conclusión, esperamos que este trabajo pueda ser de cierta utilidad para los investigadores interesados en el estudio experimental de los factores cognitivos involucrados en los trastornos emocionales, aportando información que a veces no es fácil de obtener, pero que supone un paso preliminar para poder utilizar el material estimular adecuado en diversos paradigmas experimentales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Algarabel, S., Ruíz, J.C. y Sanmartín, J. (1988). The University of Valencia's computerized word pool. *Behavior Research Methods, Instruments & Computers*, 20, 398-403.
- Belloch, A. e Ibáñez, E. (1991). Acerca del concepto de psicopatología. En A. Belloch y E. Ibáñez (Eds.) *Manual de Psicopatología (vol.1)* (pp. 1-46). Valencia: Promolibro.
- Brewin, C.R. (1988). *Cognitive foundations of Clinical Psychology*. London: LEA.
- Campos, A. y González, M.A. (1991). Imagery, meaningfulness and emotionality values of words when meaning is controlled. *Perceptual and Motor Skills*, 73, 787-791.
- Carroll, J.B., Davies, P. y Richman, B. (1971). *Word frequency book*. New York: American Heritage.
- Eysenck, M.W. (1992). *Anxiety: The cognitive perspective*. London: Hillsdale.
- Gotlib, I.H. y Cane, D.B. (1987). Construct accessibility and clinical depression: A longitudinal investigation. *Journal of Abnormal Psychology*, 96, 199-204.
- Graves, R., Landis, T. y Goodglass, H. (1981). Laterality and sex differences in visual recognition of emotional and non-emotional words. *Neuropsychologia*, 19, 95-102.
- Greenberg, M.S., Vázquez, C. y Alloy, L.B. (1988). Depression versus anxiety: Differences in self- and other-schemata. En L.B. Alloy (ed.) *Cognitive processes in depression* (pp. 109-142) New York: Guilford Press.
- Juilland, A. y Chang-Rodríguez, E. (1964). *Frequency dictionary of Spanish words*. Mouton: The Hague.
- Kucera, H. y Francis, W.N. (1967). *Computational analysis of present-day American English*. Providence, RI: Brown University Press.
- MacLeod, C. (1991). Half a century of research on the Stroop effect: An integrative review. *Psychological Bulletin*, 109, 163-203.
- MacLeod, C. y Mathews, A. (1991). Biased cognitive operations in anxiety: accessibility of information or assignment of processing priorities. *Behaviour Research and Therapy*, 30, 599-610.
- Martin, M., Williams, R.M. y Clark, D.M. (1991). Does anxiety lead to selective processing of threat-related information?. *Behaviour Research and Therapy*, 29, 147-160.
- Mathews, A. y Klug, F. (1993). Emotionality and interference with color-naming in anxiety. *Behaviour Research and Therapy*, 31, 57-62.
- Mathews, A. y MacLeod, C. (1985). Selective processing of threat cues in anxiety disorders. *Behaviour Research and Therapy*, 23, 563-569.
- Mogg, K., Bradley, B.P., Williams, R. y Mathews, A. (1993). Subliminal processing of emotional information in anxiety and depression. *Journal of Abnormal Psychology*, 102, 304-311.
- McNally, R.J., Amir, N., Louro, C.E., Lukach, B.M., Riemann, B.C. y Calamari, J.E. (1994). Cognitive processing of idiographic emotional information in panic disorder. *Behaviour Research and Therapy*, 32, 119-122.

- Paivio, A. (1971). *Imagery and verbal processes*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Pascual, J. (1984). Categorización de la información personal. *Boletín de Psicología*, 4, 33-49.
- Roget, P.M. (1962). *Roget's International Thesaurus* (3ªed.). New York: Crowell.
- Sanz, J. (1994). Autoesquemas depresivos y ansiosos. Se busca una estructura. *Boletín de Psicología*, 42, 75-107.
- Tata P.R., Leibowitz, J.A., Prunty, M.J., Cameron, M. y Pickering, A.D. (1996). Attentional bias in obsessional compulsive disorder. *Behaviour Research and Therapy*, 34, 53-60

NOTAS

¹ En el Anexo 1 no se incluyen los valores de las *F* y de las *t*, ni los grados de libertad, para no hacer excesivamente larga la tabla. El lector interesado en estos datos puede dirigirse a las autoras del trabajo.

**ANEXO 1: MEDIAS Y DESVIACIONES TÍPICAS CORRESPONDIENTES
A TODAS LAS PALABRAS**

ANEXO 1: MEDIAS Y DESVIACIONES TÍPICAS CORRESPONDIENTES A TODAS LAS PALABRAS

	Frec. de uso	Imaginación	Comprensión	Depresión	Ansiedad
Accidente ^(a)	7.35 (2.88)	8.84 (2.32)	9.33 (1.84)	5.92 (3.34)	6.68 (3.69)
Mujer/Varón ^(b)	7.43/7.04	8.92/8.58	9.43/9.00	6.10/5.34	6.85/6.10
Psic./No Psic. ^(c)	8.08/6.74(*)	9.19/8.52(*)	9.71/8.99(*)	6.09/5.76	6.94/6.45
Edad 1/2/ 3 ^(d)	7.64/6.35/8.13(*)	8.91/8.51/9.88	9.29/9.48/9.38	6.23/5.00/4.88(*)	6.94/6.27/4.50
Estu. 1/2/3 ^(e)	7.77/7.29/7.41	8.31/8.97/8.60	9.62/9.15/9.64	5.00/6.25/5.41	5.00/7.16/6.17
Achacoso ^(a)	2.67 (2.92)	5.23 (3.65)	6.40 (3.54)	4.72 (3.50)	3.09 (3.14)
Mujer/Varón ^(b)	2.59/2.96	4.97/6.10(*)	6.33/6.63	4.66/4.84	3.34/3.18
Psic./No Psic. ^(c)	2.78/2.61	5.55/4.98	6.80/6.04	5.55/4.03(*)	3.27/3.35
Edad 1/2/ 3 ^(d)	2.44/3.10/5.50(*)	4.66/6.72/7.88(*)	5.83/7.73/9.00(*)	4.81/4.27/5.88	3.35/3.22/3.50
Estu. 1/2/3 ^(e)	3.54/2.35/3.19(*)	5.17/4.65/6.45(*)	5.69/5.92/7.53(*)	4.38/4.65/4.98	3.69/3.33/3.25
Agitado ^(a)	4.97 (3.18)	7.13 (2.82)	8.46 (2.30)	3.00 (3.08)	7.80 (2.86)
Mujer/Varón ^(b)	5.02/4.76	7.09/7.24	8.68/7.78(*)	3.00/2.92	7.85/7.63
Psic./No Psic. ^(c)	5.20/4.76	7.36/6.93	8.90/8.08(*)	2.77/3.14	8.33/7.33(*)
Edad 1/2/ 3 ^(d)	5.07/4.53/6.43	7.01/7.29/8.13	8.39/8.59/8.75	2.70/3.65/3.88	7.93/7.20/8.63
Estu. 1/2/3 ^(e)	5.31/4.81/5.29	7.54/6.97/7.34	7.38/8.26/9.08(*)	3.23/2.84/3.38	7.54/7.88/7.72
Agonizante ^(a)	3.64 (3.15)	7.12 (2.98)	8.39 (2.35)	5.12 (3.63)	5.71 (3.54)
Mujer/Varón ^(b)	3.56/3.92	7.09/7.22	8.42/8.31	5.16/5.06	5.75/5.65
Psic./No Psic. ^(c)	4.02/3.33	7.59/6.72(*)	8.72/8.11	5.03/5.24	5.40/5.97
Edad 1/2/ 3 ^(d)	3.82/3.02/4.00	6.89/7.76/7.63	8.30/8.80/8.63	5.41/4.41/5.63	6.23/4.47/5.13(*)
Estu. 1/2/3 ^(e)	3.23/3.47/4.05	5.38/6.95/7.79(*)	7.62/8.24/8.86	5.77/5.26/4.81	5.23/5.84/5.64
Alarmado ^(a)	4.91 (3.13)	6.78 (2.98)	8.62 (2.10)	3.25 (3.00)	7.73 (2.71)
Mujer/Varón ^(b)	4.94/4.72	6.68/7.10	8.67/8.45	3.20/3.46	7.78/7.53
Psic./No Psic. ^(c)	5.60/4.27(*)	6.93/6.66	8.76/8.48	3.07/3.41	8.46/7.08(*)
Edad 1/2/ 3 ^(d)	4.88/4.73/6.00	6.91/6.51/7.13	8.57/8.65/9.50	3.27/2.94/4.00	8.07/7.00/5.63(*)
Estu. 1/2/3 ^(e)	5.31/4.76/5.00	6.54/6.82/6.67	8.38/8.47/8.93	3.54/3.27/3.14	5.92/7.84/7.84(*)
Amenaza ^(a)	5.02 (3.31)	6.62 (3.18)	8.89 (2.13)	4.80 (3.60)	7.82 (2.86)
Mujer/Varón ^(b)	5.05/4.88	6.60/6.65	8.71/8.59	4.96/4.39	8.28/7.80
Psic./No Psic. ^(c)	5.95/4.20(*)	6.87/6.41	9.10/8.32(*)	4.78/4.85	8.67/7.07(*)
Edad 1/2/ 3 ^(d)	5.08/4.55/6.14	6.76/6.61/4.88	8.66/8.73/9.00	5.10/4.21/3.63	8.15/7.31/4.38(*)
Estu. 1/2/3 ^(e)	5.08/4.68/5.71	6.08/6.62/6.67	7.92/8.52/9.19	4.69/4.97/4.56	6.00/8.28/8.38(*)
Amenazado ^(a)	5.18 (3.16)	7.33 (2.78)	9.09 (1.69)	5.65 (3.27)	8.14 (2.75)
Mujer/Varón ^(b)	5.31/4.75	7.39/7.22	9.11/9.04	5.85/5.14	7.94/7.41
Psic./No Psic. ^(c)	6.00/4.49(*)	7.45/7.27	9.25/8.96	5.36/5.91	8.68/7.07(*)
Edad 1/2/ 3 ^(d)	5.21/4.86/7.13	7.07/7.88/9.13(*)	8.99/9.43/9.50	5.54/5.67/8.50(*)	8.36/7.86/7.00
Estu. 1/2/3 ^(e)	4.69/4.82/6.10(*)	8.23/7.13/7.52	8.92/9.05/9.20	6.15/5.82/5.22	6.69/7.70/8.31
Ansioso ^(a)	6.07 (3.27)	7.22 (2.93)	8.49 (2.23)	3.90 (3.63)	9.54 (1.53)
Mujer/Varón ^(b)	6.28/5.31	7.23/7.18	8.49/8.43	4.18/3.10	9.67/9.12
Psic./No Psic. ^(c)	7.01/5.23(*)	7.84/6.69	8.69/8.27	3.25/4.49(*)	9.82/9.29(*)
Edad 1/2/ 3 ^(d)	6.31/5.38/5.43	7.40/6.88/7.00	8.39/8.54/9.13(*)	3.46/5.21/4.88(*)	9.50/9.56/10.0(*)
Estu. 1/2/3 ^(e)	3.85/6.05/6.56(*)	6.92/7.10/7.49	7.00/8.44/8.83(*)	4.31/3.95/3.84	9.23/9.50/9.69
Aprensión ^(a)	2.78 (2.91)	4.39 (3.63)	6.70 (3.34)	4.77 (3.34)	6.22 (3.46)
Mujer/Varón ^(b)	2.84/2.60	4.47/4.20	6.74/6.55	4.82/4.56	6.17/6.32
Psic./No Psic. ^(c)	2.97/2.64	4.43/4.41	7.00/6.41	5.14/4.42	6.62/5.85
Edad 1/2/ 3 ^(d)	2.35/3.57/5.00(*)	3.76/5.96/7.13(*)	6.17/7.90/9.50(*)	4.70/4.76/5.50	6.16/6.31/5.88
Estu. 1/2/3 ^(e)	3.00/2.45/3.38	6.54/3.74/5.32(*)	7.08/6.13/7.78(*)	5.54/4.82/4.59	5.85/6.14/6.57
Arriesgado ^(a)	6.04 (2.93)	7.67 (2.72)	8.70 (2.14)	1.90 (2.52)	6.59 (3.39)
Mujer/Varón ^(b)	6.02/6.06	7.43/8.33(*)	8.68/8.78	2.01/1.55	6.57/6.61
Psic./No Psic. ^(c)	6.67/5.50(*)	7.54/7.75	8.88/8.54	2.09/1.71	7.39/5.88(*)
Edad 1/2/ 3 ^(d)	6.23/5.24/7.25	7.76/7.31/7.50	8.75/8.53/8.50	1.90/1.94/1.63	6.93/5.67/5.25(*)
Estu. 1/2/3 ^(e)	6.08/5.85/6.39	8.55/7.98/7.25(*)	7.38/8.78/8.75	2.69/1.60/2.41	6.38/6.76/6.24

	Frec. de uso	Imaginación	Comprensión	Depresión	Ansiedad
Asustado ^(a)	6.52 (3.14)	7.87 (2.53)	8.96 (1.89)	5.21 (3.64)	8.08 (2.57)
Mujer/ Varón ^(b)	6.84/5.46(*)	7.86/7.86	9.03/8.76	5.26/5.15	8.13/7.88
Psic./ No Psi. ^(c)	7.21/5.91(*)	8.07/7.67	9.21/8.75	5.35/5.16	8.40/7.81
Edad1/2/ 3 ^(d)	6.75/5.73/6.86	7.88/7.94/8.38	8.94/9.10/9.38	5.45/4.67/5.25	8.28/7.90/5.13(*)
Estu.1/2/3 ^(e)	5.92/6.40/6.90	7.31/7.80/8.07	8.62/8.82/9.33	4.46/5.42/5.07	6.54/8.09/8.45
Aterrorizado ^(a)	5.35 (3.25)	8.31 (2.31)	8.91 (2.02)	4.81 (3.57)	8.54 (2.47)
Mujer/ Varón ^(b)	5.56/4.63	8.28/8.39	8.84/9.12	4.91/4.55	8.64/8.22
Psic./ No Psi. ^(c)	6.10/4.69(*)	8.68/7.97(*)	9.21/8.64(*)	4.50/5.11	8.86/8.24
Edad1/2/ 3 ^(d)	5.65/4.53/4.88	8.39/8.10/8.00	9.02/8.63/8.63	4.90/4.69/5.25	8.68/8.29/7.38
Estu.1/2/3 ^(e)	4.62/5.18/5.85	7.31/8.31/8.45	7.62/8.95/9.07	6.23/4.91/4.38	6.92/8.60/8.76(*)
Avergonzado ^(a)	6.86 (2.83)	7.53 (3.10)	9.11 (1.95)	6.19 (3.10)	6.27 (3.24)
Mujer/ Varón ^(b)	7.13/6.00(*)	7.57/7.41	9.13/9.06	6.12/6.44	6.41/5.82
Psic./ No Psi. ^(c)	7.34/6.47(*)	7.90/7.26	9.51/8.76(*)	6.40/6.04	6.28/6.22
Edad1/2/ 3 ^(d)	7.15/5.98/7.75(*)	7.56/7.49/8.50	9.19/9.06/8.75	6.19/6.24/6.63	6.46/5.86/5.38
Estu.1/2/3 ^(e)	7.69/6.80/6.81	7.08/7.38/7.98	9.08/9.04/9.25	5.77/6.17/6.55	3.92/6.49/6.41(*)
Cansado ^(a)	8.29 (2.53)	8.14 (2.92)	9.09 (2.20)	6.52 (3.67)	3.49 (3.37)
Mujer/ Varón ^(b)	8.40/7.92	8.13/8.18	9.07/9.16	6.73/5.84	3.65/3.06
Psic./ No Psi. ^(c)	8.75/7.89(*)	8.51/7.86	9.48/8.76	7.50/5.67(*)	3.19/3.78
Edad1/2/ 3 ^(d)	8.49/7.59/9.13	8.23/7.96/9.13	9.17/8.96/9.63	6.65/6.45/6.63	3.54/3.67/2.38
Estu.1/2/3 ^(e)	8.38/8.20/8.41	7.85/8.01/8.52	9.15/9.01/9.25	6.69/6.34/7.00	4.54/3.64/3.02
Castigo ^(a)	5.65 (3.42)	7.77 (2.81)	8.82 (2.09)	5.26 (3.64)	5.15 (3.51)
Mujer/ Varón ^(b)	5.68/5.51	7.69/7.55	8.83/8.78	5.24/5.45	5.27/4.84
Psic./ No Psi. ^(c)	6.52/4.88(*)	7.92/7.43	9.09/8.57	5.44/5.14	5.36/5.03
Edad1/2/ 3 ^(d)	5.89/4.82/6.50	7.64/7.65/7.25	8.85/8.88/8.63	5.69/4.37/4.00(*)	5.62/3.84/4.38(*)
Estu.1/2/3 ^(e)	5.08/5.55/5.97	5.92/7.79/7.72	7.69/8.76/9.17	3.77/5.58/4.96	3.62/5.89/3.90(*)
Catástrofe ^(a)	5.63 (3.14)	8.60 (2.33)	9.00 (1.98)	6.37 (3.48)	6.85 (3.50)
Mujer/ Varón ^(b)	5.68/5.43	8.67/8.37	9.03/8.86	6.82/5.02(*)	7.03/6.27
Psic./ No Psi. ^(c)	6.18/5.16(*)	8.92/8.32	9.35/8.68(*)	6.57/6.21	7.28/6.44
Edad1/2/ 3 ^(d)	5.81/4.77/7.38(*)	8.70/8.18/10.00	8.93/9.20/9.75	6.66/5.51/6.63	7.22/5.86/6.00(*)
Estu.1/2/3 ^(e)	6.08/5.38/6.08	7.46/8.74/8.48	9.38/8.88/9.14	6.77/6.39/6.31	5.15/7.08/6.84
Criticado ^(a)	6.17 (3.23)	7.03 (3.08)	8.87 (1.95)	5.78 (3.55)	5.80 (3.60)
Mujer/ Varón ^(b)	6.25/5.82	7.04/7.10	8.86/8.88	5.57/6.57	5.96/5.42
Psic./ No Psi. ^(c)	6.90/5.52(*)	6.90/7.20	9.15/8.61(*)	6.13/5.52	5.95/5.75
Edad1/2/ 3 ^(d)	6.32/5.47/7.13	6.99/7.58/5.38	8.87/8.98/8.75	6.12/4.85/5.38	6.14/4.65/6.25(*)
Estu.1/2/3 ^(e)	5.77/6.01/6.55	6.77/6.99/7.12	7.62/8.84/9.14(*)	3.15/6.02/5.84(*)	4.85/6.22/5.12
Culpable ^(a)	5.99 (3.16)	6.86 (3.05)	8.96 (1.92)	6.95 (3.28)	6.52 (3.48)
Mujer/ Varón ^(b)	6.09/5.63	6.68/7.38	8.98/8.92	7.10/6.49	6.47/6.67
Psic./ No Psi. ^(c)	6.80/5.30(*)	6.81/6.90	9.24/8.72(*)	7.31/6.64	6.17/6.85
Edad1/2/ 3 ^(d)	6.38/4.80/6.50(*)	6.76/6.78/8.88	9.00/8.86/8.63	7.23/6.41/5.75	6.43/6.51/8.25
Estu.1/2/3 ^(e)	5.46/5.90/6.37	7.00/6.91/6.66	7.62/8.96/9.22(*)	5.85/6.98/7.26	7.54/6.93/5.38(*)
Dañado ^(a)	4.95 (3.21)	6.63 (3.38)	8.67 (2.42)	4.30 (3.32)	5.41 (3.57)
Mujer/ Varón ^(b)	5.14/4.31	6.56/6.88	8.69/8.61	4.53/3.59	5.48/5.10
Psic./ No Psi. ^(c)	5.63/4.40(*)	6.65/6.66	9.13/8.27(*)	4.32/4.28	6.05/4.83(*)
Edad1/2/ 3 ^(d)	4.90/4.90/6.38	6.50/7.02/7.75	8.72/8.47/9.38	4.57/3.82/2.88	5.76/4.55/3.00(*)
Estu.1/2/3 ^(e)	4.23/4.76/5.54	6.46/6.58/6.76	7.15/8.66/8.97(*)	3.15/4.42/4.31	4.31/5.55/5.40
Débil ^(a)	6.57 (3.08)	7.29 (2.96)	8.90 (1.91)	6.57 (3.26)	3.35 (3.06)
Mujer/ Varón ^(b)	6.68/6.16	7.44/6.86	8.91/8.86	6.51/6.76	3.37/3.33
Psic./ No Psi. ^(c)	7.01/6.19	7.66/7.03	9.26/8.58(*)	7.46/5.83(*)	3.21/3.50
Edad1/2/ 3 ^(d)	6.85/5.80/6.75	7.36/7.57/6.50	8.97/8.88/8.63	6.81/6.06/4.75	3.22/3.86/3.75
Estu.1/2/3 ^(e)	7.00/6.39/6.88	6.62/7.26/7.50	8.00/8.85/9.15	5.77/6.57/6.79	5.46/3.27/3.19
Defensivo ^(a)	4.42 (3.09)	5.72 (3.28)	8.07 (2.46)	4.22 (3.42)	6.04 (3.40)
Mujer/ Varón ^(b)	4.34/4.65	5.65/6.02	8.05/8.12	4.04/4.69	6.13/5.80
Psic./ No Psi. ^(c)	5.09/3.87(*)	5.83/5.69	8.14/7.99	4.46/4.00	6.60/5.56(*)
Edad1/2/ 3 ^(d)	4.37/4.31/6.00	5.75/5.88/5.38	8.03/8.20/8.78	4.21/4.22/4.00	6.08/6.08/4.38
Estu.1/2/3 ^(e)	4.23/4.29/4.64	5.46/5.72/5.72	7.15/7.92/8.56	3.31/4.30/4.33	6.15/6.00/6.12

	Frec. de uso	Imaginación	Comprensión	Depresión	Ansiedad
Deficiente^(a)	4.53 (3.25)	6.48 (3.41)	8.30 (2.51)	3.85 (3.74)	2.76 (3.17)
Mujer/ Varón ^(b)	4.64/4.12	6.41/6.67	8.47/7.73	3.62/4.67	2.79/2.71
Psic./ No Psi. ^(c)	5.58/3.60	6.68/6.28	8.48/8.11	3.52/4.19	2.66/2.88
Edad1/2/ 3 ^(d)	4.61/4.14/4.86	6.43/6.73/5.75	8.19/8.53/8.50	3.93/3.39/5.63	2.87/2.22/3.50
Estu.1/2/ 3 ^(e)	4.31/4.22/5.17	6.08/6.48/6.44	7.62/8.19/8.60	3.46/4.30/2.84(*)	3.31/3.09/1.74(*)
Deprimido^(a)	7.06 (2.89)	7.57 (2.86)	8.94 (1.79)	9.34 (1.98)	4.72 (3.75)
Mujer/ Varón ^(b)	7.30/6.28(*)	7.56/7.65	8.98/8.82	9.23/9.69	4.82/4.47
Psic./ No Psi. ^(c)	7.64/6.58(*)	7.74/7.42	8.96/8.92	9.63/9.09(*)	3.76/5.57(*)
Edad1/2/ 3 ^(d)	7.29/6.43/7.14	7.54/7.69/7.50	8.88/9.08/9.13	9.46/9.10/8.50	4.37/5.94/4.63(*)
Estu.1/2/ 3 ^(e)	6.31/6.92/7.47	7.00/7.34/8.10	8.38/8.81/9.32	8.46/9.32/9.55	5.54/4.94/4.17(*)
Desamparado^(a)	4.35 (3.30)	6.71 (3.18)	8.67 (2.15)	7.54 (3.20)	5.45 (3.66)
Mujer/ Varón ^(b)	4.49/3.82	6.80/6.48	8.78/8.33	7.44/7.84	5.65/4.92
Psic./ No Psi. ^(c)	4.59/4.11	6.97/6.51	8.98/8.40(*)	7.89/7.23	4.83/6.03(*)
Edad1/2/ 3 ^(d)	4.37/3.73/7.75(*)	6.73/6.78/7.00	8.64/8.92/8.88	7.91/6.55/6.38(*)	5.42/5.53/5.88
Estu.1/2/ 3 ^(e)	6.31/4.12/4.53	6.08/6.68/6.84	7.85/8.54/9.12	6.38/7.73/7.29	6.08/5.72/4.74
Desanimado^(a)	6.64 (2.77)	7.36 (.89)	8.84 (2.04)	8.82 (2.28)	4.26 (3.50)
Mujer/ Varón ^(b)	6.81/6.49	7.30/7.59	8.89/8.67	8.86/8.65	4.33/4.12
Psic./ No Psi. ^(c)	7.23/6.33(*)	7.46/7.34	8.97/8.72	9.20/8.48(*)	3.98/4.52
Edad1/2/ 3 ^(d)	6.89/6.14/7.63	7.39/7.55/6.63	8.73/9.20/8.38	8.87/8.73/7.75	3.97/5.14/5.00
Estu.1/2/ 3 ^(e)	7.62/6.46/7.12	6.00/7.39/7.60	8.38/8.85/8.86	8.92/8.69/9.14	4.92/4.33/4.09
Desastre^(a)	6.77 (2.97)	7.67 (2.96)	8.64 (2.29)	5.78 (3.75)	5.15 (3.80)
Mujer/ Varón ^(b)	7.03/5.94(*)	7.75/7.47	8.67/8.58	5.80/5.78	5.28/4.66
Psic./ No Psi. ^(c)	7.22/6.39(*)	7.98/7.43	9.01/8.34(*)	6.37/5.31(*)	5.49/4.83
Edad1/2/ 3 ^(d)	7.02/5.94/8.13(*)	7.80/7.33/7.63	8.56/8.84/9.25	5.96/5.49/4.63	5.22/4.51/7.25
Estu.1/2/ 3 ^(e)	6.85/6.73/6.88	6.46/7.59/8.07	8.23/8.54/8.95	5.08/5.73/5.98	3.92/5.40/4.91
Desconfiado^(a)	6.76 (2.93)	6.36 (3.44)	8.97 (2.12)	4.18 (3.35)	6.00 (3.36)
Mujer/ Varón ^(b)	6.99/6.00(*)	6.69/7.00	8.92/9.10	4.10/4.47	6.03/5.96
Psic./ No Psi. ^(c)	7.33/6.29(*)	6.75/6.82	9.44/8.55(*)	4.38/4.00	6.80/5.35(*)
Edad1/2/ 3 ^(d)	7.04/5.92/6.50	6.72/7.17/6.00	8.95/8.94/9.50	4.05/4.73/4.00	6.31/5.37/3.88(*)
Estu.1/2/ 3 ^(e)	6.69/6.65/7.03	7.77/6.59/6.91	9.46/8.79/9.22	5.69/4.20/3.84	4.15/6.37/5.60(*)
Descuidado^(a)	6.46 (2.72)	7.33 (3.03)	8.59 (2.30)	4.30 (3.76)	2.75 (3.01)
Mujer/ Varón ^(b)	6.46/6.51	7.26/7.67	8.56/8.71	4.37/4.06	2.80/2.65
Psic./ No Psi. ^(c)	6.81/6.20	7.66/7.15	9.03/8.22(*)	5.47/3.30(*)	2.88/2.66
Edad1/2/ 3 ^(d)	6.77/5.55/6.88(*)	7.48/7.21/6.75	8.65/8.47/9.00	4.54/3.82/4.13	2.92/2.53/1.25
Estu.1/2/ 3 ^(e)	5.92/6.33/6.85	5.15/7.38/7.74(*)	7.69/8.50/8.92	2.92/3.88/5.78(*)	1.92/2.91/2.64
Desdeñado^(a)	1.74 (2.35)	4.17 (3.46)	5.77 (3.54)	4.74 (3.73)	3.29 (3.32)
Mujer/ Varón ^(b)	1.67/1.92	4.04/4.68	5.85/5.49	4.75/4.62	3.24/3.51
Psic./ No Psi. ^(c)	1.96/1.54	4.51/3.89	6.34/5.23(*)	5.79/3.77(*)	3.49/3.16
Edad1/2/ 3 ^(d)	1.60/1.98/2.75	3.97/4.65/5.50	5.42/6.49/7.50	4.66/4.49/6.75	3.29/3.20/4.00
Estu.1/2/ 3 ^(e)	1.85/1.63/2.00	4.08/3.83/4.81	4.92/5.23/7.05(*)	4.46/4.37/5.60	3.31/3.37/3.00
Desdichado^(a)	4.18 (3.29)	6.75 (3.18)	8.95 (1.84)	8.65 (2.38)	5.46 (3.63)
Mujer/ Varón ^(b)	4.26/3.88	6.69/6.92	9.03/8.69	8.68/8.53	5.42/5.71
Psic./ No Psi. ^(c)	4.42/3.98	6.89/6.67	9.29/8.65(*)	9.07/8.27(*)	4.73/6.12(*)
Edad1/2/ 3 ^(d)	4.16/4.00/6.00	6.67/6.76/8.63	8.83/9.31/9.63	8.74/8.43/8.00	5.38/6.00/4.63
Estu.1/2/ 3 ^(e)	5.15/3.85/4.76	7.69/6.48/7.17	9.15/8.76/9.32	7.62/8.62/8.98	6.46/5.72/4.74
Desesperado^(a)	5.76 (3.30)	7.36 (3.01)	8.86 (2.02)	7.53 (3.29)	8.63 (2.19)
Mujer/ Varón ^(b)	6.04/4.84(*)	7.36/7.43	8.92/8.69	7.66/7.22	8.63/8.63
Psic./ No Psi. ^(c)	6.52/5.14(*)	7.39/7.42	9.05/8.70	7.66/7.44	8.52/8.73
Edad1/2/ 3 ^(d)	6.02/4.88/7.13	7.18/7.92/8.88	8.70/9.41/8.88	7.46/7.86/7.75	8.66/8.63/7.88
Estu.1/2/ 3 ^(e)	5.38/5.57/6.34	7.69/7.16/7.76	8.54/8.69/9.29	6.99/7.28/8.25	9.31/8.77/8.22
Desgracia^(a)	6.29 (3.16)	7.52 (2.90)	8.87 (1.99)	8.45 (2.51)	5.18 (3.61)
Mujer/ Varón ^(b)	6.35/6.06	7.30/8.18	8.87/8.88	8.41/8.53	5.08/5.59
Psic./ No Psi. ^(c)	6.75/5.87(*)	7.48/7.52	9.19/8.59(*)	8.79/8.13	4.72/5.59
Edad1/2/ 3 ^(d)	6.47/5.40/8.00(*)	7.48/7.73/6.88	8.92/8.63/9.13	8.66/7.88/7.63	5.19/5.45/4.63
Estu.1/2/ 3 ^(e)	7.18/6.02/6.63	6.09/7.49/7.76	7.64/8.85/9.08	7.50/8.48/8.53	6.69/5.25/4.67

	Frec. de uso	Imaginación	Comprensión	Depresión	Ansiedad
Desinterés^(a)	5.67 (3.12)	6.37 (3.28)	8.70 (2.22)	6.28 (3.92)	2.58 (2.88)
Mujer/ Varón ^(b)	5.73/5.45	6.11/7.28(*)	8.76/8.49	6.53/5.43	2.57/2.67
Psic./ No Psi. ^(c)	6.21/5.19(*)	6.61/6.24	9.19/8.27(*)	7.77/4.96(*)	2.80/2.43
Edad1/2/3 ^(d)	5.65/5.25/8.00	6.49/6.44/4.88	8.74/8.56/8.38	6.54/5.38/5.38	2.55/2.61/3.38
Estu.1/2/3 ^(e)	5.92/5.42/6.08	5.33/6.27/6.83	6.75/8.64/9.17	5.25/5.82/7.52(*)	2.85/2.60/2.52
Despreciable^(a)	4.91 (3.38)	6.14 (3.37)	8.77 (2.18)	5.37 (3.70)	3.39 (3.45)
Mujer/ Varón ^(b)	5.06/4.41	5.87/7.04(*)	8.67/9.10	5.41/5.24	3.40/3.43
Psic./ No Psi. ^(c)	5.78/4.18(*)	5.75/6.50	9.11/8.47(*)	5.25/5.42	2.81/3.86(*)
Edad1/2/3 ^(d)	5.03/4.35/5.75	6.12/6.29/6.00	8.77/8.71/9.25	5.47/4.71/6.63	3.38/3.27/3.63
Estu.1/2/3 ^(e)	5.08/4.47/5.80(*)	5.85/5.97/6.48	8.08/8.60/9.29	5.38/5.31/5.41	3.85/3.52/2.84
Desprecio^(a)	5.08 (3.32)	6.63 (3.19)	8.84 (2.03)	7.53 (2.89)	5.05 (3.72)
Mujer/ Varón ^(b)	5.16/4.75	6.48/7.12	8.85/8.80	7.41/7.90	5.06/5.10
Psic./ No Psi. ^(c)	5.73/4.48(*)	6.52/7.33	9.08/8.62	7.65/7.43	4.85/5.27
Edad1/2/3 ^(d)	5.27/3.98/7.50(*)	6.53/6.98/6.88	8.87/8.84/9.13	7.77/6.84/7.38	5.12/5.12/4.25
Estu.1/2/3 ^(e)	6.31/4.88/5.19	6.23/6.63/6.62	8.77/8.74/9.05	7.85/7.78/6.81	5.77/5.45/4.02(*)
Destruído^(a)	5.31 (3.28)	7.32 (3.07)	8.64 (2.25)	6.67 (3.31)	4.87 (3.53)
Mujer/ Varón ^(b)	5.38/5.04	7.36/7.16	8.75/8.31	6.84/6.65	5.01/4.53
Psic./ No Psi. ^(c)	5.81/4.88(*)	7.65/7.05	9.08/8.26(*)	6.96/6.64	4.43/5.30
Edad1/2/3 ^(d)	5.65/4.11/6.88	7.30/7.27/7.25	8.61/8.63/8.88	6.85/6.56/6.50	5.01/4.58/4.88
Estu.1/2/3 ^(e)	6.33/5.24/5.31(*)	6.00/7.30/7.57	8.08/8.47/9.10	7.42/6.78/6.52	5.46/5.07/4.29
Dolorido^(a)	5.36 (3.03)	7.11 (2.94)	8.94 (1.75)	5.76 (3.31)	4.36 (3.27)
Mujer/ Varón ^(b)	5.33/4.78	7.02/7.41	8.94/8.92	5.77/5.84	4.33/4.51
Psic./ No Psi. ^(c)	5.65/5.12	7.18/7.10	9.14/8.76	5.97/5.65	4.19/4.54
Edad1/2/3 ^(d)	5.29/5.50/6.63	6.89/7.80/8.00	8.87/9.22/9.00	5.97/5.31/5.63	4.58/4.04/3.63
Estu.1/2/3 ^(e)	6.23/5.09/5.86	7.15/6.97/7.43	8.77/8.88/9.07	5.15/5.75/6.16	4.15/4.61/3.97
Dubitativo^(a)	4.26 (3.23)	6.47 (3.39)	8.45 (2.37)	5.00 (3.48)	5.81 (3.28)
Mujer/ Varón ^(b)	4.35/3.98	6.48/6.49	8.43/8.53	4.98/5.14	5.89/5.57
Psic./ No Psi. ^(c)	4.55/4.03	6.79/6.27	9.02/7.96(*)	5.52/4.58(*)	5.88/5.77
Edad1/2/3 ^(d)	4.31/4.17/4.13	6.45/6.92/4.63	8.48/8.76/7.00	5.00/5.22/5.25	5.68/6.67/3.00(*)
Estu.1/2/3 ^(e)	3.46/3.80/5.48(*)	5.85/6.10/7.46(*)	7.15/8.20/9.25(*)	5.31/4.66/5.86	6.38/5.57/6.41
Embarazoso^(a)	4.49 (3.18)	6.28 (3.31)	8.64 (2.03)	3.95 (3.21)	6.57 (3.41)
Mujer/ Varón ^(b)	4.78/3.55(*)	6.30/6.27	8.71/8.41	4.03/3.76	6.84/5.67(*)
Psic./ No Psi. ^(c)	4.67/4.35	6.46/6.20	9.02/8.30(*)	4.02/3.93	7.25/5.97(*)
Edad1/2/3 ^(d)	4.29/4.92/6.13	6.15/6.92/6.63	8.47/9.16/8.88	3.82/4.12/5.75	6.82/6.12/4.25
Estu.1/2/3 ^(e)	4.92/4.31/4.81	7.38/6.06/6.53	8.46/8.42/9.12	6.08/3.62/4.33(*)	6.23/6.56/6.78
Emocionado^(a)	7.48 (2.43)	7.91 (2.68)	8.72 (2.09)	2.25 (2.92)	5.81 (3.46)
Mujer/ Varón ^(b)	7.60/7.10	7.87/8.16	8.69/8.78	2.24/2.29	5.74/6.06
Psic./ No Psi. ^(c)	7.71/7.30	7.84/8.06	8.89/8.55	2.69/1.83(*)	6.16/5.49
Edad1/2/3 ^(d)	7.64/6.90/8.88(*)	8.05/7.56/8.75	8.71/8.69/8.38	2.14/2.29/4.00	6.15/4.67/5.75(*)
Estu.1/2/3 ^(e)	8.08/7.34/7.66	7.46/8.01/7.77	7.77/8.74/8.81	2.62/1.85/3.09(*)	5.23/5.96/5.53
Enfermizo^(a)	4.80 (3.05)	7.60 (2.70)	8.67 (2.21)	6.97 (3.14)	4.98 (3.46)
Mujer/ Varón ^(b)	4.70/5.06	7.60/7.70	8.76/8.37	6.97/6.98	5.10/4.65
Psic./ No Psi. ^(c)	5.06/4.54(*)	7.64/7.61	9.02/8.36(*)	6.75/7.18	4.60/5.28
Edad1/2/3 ^(d)	4.95/3.98/6.63(*)	7.49/7.88/8.38	8.58/8.86/9.13	6.87/7.20/7.50	5.00/5.16/4.13
Estu.1/2/3 ^(e)	5.00/4.73/4.85	8.31/7.46/7.67	8.38/8.51/9.05	7.00/7.07/6.71	5.85/5.37/3.83(*)
Enfermo^(a)	7.21 (2.94)	8.57 (2.41)	9.15 (1.18)	7.83 (2.73)	6.11 (3.50)
Mujer/ Varón ^(b)	7.49/6.27(*)	8.64/8.33	9.22/8.90	7.88/7.71	6.16/5.96
Psic./ No Psi. ^(c)	7.88/6.65(*)	8.93/8.27(*)	9.33/9.05	7.82/7.85	6.42/5.84
Edad1/2/3 ^(d)	7.34/6.69/8.25	8.62/8.41/9.25	9.07/9.51/9.25	7.80/7.84/8.50	6.08/6.25/6.88
Estu.1/2/3 ^(e)	7.69/6.96/7.76	8.15/8.57/8.64	8.77/9.15/9.32	8.54/7.77/7.83	7.08/5.92/6.54
Entumecido^(a)	2.19 (2.63)	4.60 (3.35)	6.34 (3.32)	4.66 (3.45)	3.49 (3.01)
Mujer/ Varón ^(b)	2.18/2.22	4.52/4.82	6.23/6.69	4.65/4.71	3.57/3.25
Psic./ No Psi. ^(c)	2.20/2.19	4.80/4.43	6.32/6.32	5.55/3.96(*)	3.71/3.27
Edad1/2/3 ^(d)	1.97/2.67/3.75	4.18/5.67/6.13(*)	5.62/7.98/8.88(*)	4.77/4.20/5.00	3.41/3.80/1.75
Estu.1/2/3 ^(e)	3.15/2.01/2.36	5.38/4.28/5.00	7.08/5.94/6.92	5.54/4.49/4.93	4.69/3.22/3.84

	Frec. de uso	Imaginación	Comprensión	Depresión	Ansiedad
Estúpido^(a)	5.83 (3.36)	5.89 (3.41)	8.46 (2.38)	3.18 (3.36)	2.58 (2.90)
Mujer/ Varón ^(b)	6.00/5.29	5.69/6.55	8.54/8.25	3.23/3.08	2.48/2.90
Psic./ No Psi. ^(c)	6.72/5.09(*)	5.84/5.96	8.77/8.20	3.36/3.06	2.56/2.62
Edad1/2/ 3 ^(d)	6.12/5.12/5.38	5.80/6.60/4.75	8.50/8.43/8.88	3.36/2.76/2.38	2.69/2.10/4.25
Estu.1/2/3 ^(e)	5.92/5.57/6.39	6.00/5.55/6.56	7.85/8.38/8.71	2.54/3.12/3.50	3.31/2.76/2.12
Fatiga^(a)	5.96 (3.15)	7.39 (2.92)	8.76 (2.03)	6.21 (3.53)	4.87 (3.48)
Mujer/ Varón ^(b)	6.00/5.78	7.31/7.72	8.88/8.37	6.31/5.86	5.16/4.04
Psic./ No Psi. ^(c)	6.48/5.49(*)	7.78/7.09	9.09/8.46(*)	7.35/5.19(*)	5.22/4.60
Edad1/2/ 3 ^(d)	6.01/5.69/6.75	7.49/7.35/6.75	8.72/8.78/9.00	6.14/6.35/5.13	4.77/5.61/4.00
Estu.1/2/3 ^(e)	5.85/5.64/6.68	6.69/7.27/7.72	8.00/8.65/9.12	6.31/5.64/7.38(*)	5.85/4.64/5.26
Fracasado^(a)	5.73 (3.61)	7.07 (3.12)	9.11 (2.12)	8.71 (2.32)	5.78 (3.65)
Mujer/ Varón ^(b)	5.90/5.14	7.01/7.27	9.05/9.30	8.81/8.39	5.82/5.76
Psic./ No Psi. ^(c)	6.39/5.18(*)	7.17/6.96	9.40/8.86	8.99/8.46	5.30/6.20
Edad1/2/ 3 ^(d)	5.99/4.69/6.63(*)	6.97/7.25/7.63	9.14/9.13/9.38	8.77/8.41/9.38	5.78/5.63/7.50
Estu.1/2/3 ^(e)	4.92/5.64/6.03	7.85/6.79/7.45	9.00/9.07/9.20	8.31/8.82/8.56	6.69/6.01/4.95
Fracaso^(a)	6.09 (3.27)	6.85 (3.16)	9.00 (1.93)	8.18 (2.71)	5.74 (3.74)
Mujer/ Varón ^(b)	6.16/5.80	6.77/7.18	8.99/9.02	8.17/8.22	5.83/5.53
Psic./ No Psi. ^(c)	6.69/5.56(*)	6.89/6.84	9.24/8.79	8.33/8.04	5.27/6.19
Edad1/2/ 3 ^(d)	6.35/5.02/7.50(*)	6.79/7.10/6.75	9.02/8.94/9.00	8.44/7.37/8.13	5.77/5.94/4.50(*)
Estu.1/2/3 ^(e)	7.31/5.93/6.17	6.15/6.82/6.97	9.08/8.88/9.22	8.00/8.27/7.91	5.46/6.28/4.53(*)
Herido^(a)	6.37 (3.19)	8.34 (2.63)	9.26 (1.75)	5.36 (3.44)	4.81 (3.59)
Mujer/ Varón ^(b)	6.66/5.42(*)	8.32/8.35	9.22/9.39	5.54/4.78	4.94/4.49
Psic./ No Psi. ^(c)	6.80/6.04	8.66/8.05	9.51/9.04(*)	5.50/5.27	4.95/4.73
Edad1/2/ 3 ^(d)	6.47/6.17/6.75	8.42/7.94/9.75	9.30/9.20/9.88	5.50/4.61/7.63(*)	5.19/4.27/2.75
Estu.1/2/3 ^(e)	6.00/6.09/7.17	8.00/8.34/8.38	9.31/9.25/9.27	5.00/5.62/4.91	2.69/5.15/4.64(*)
Hipocondría^(a)	3.05 (2.91)	5.43 (3.79)	6.73 (3.49)	5.31 (3.32)	7.32 (3.18)
Mujer/ Varón ^(b)	2.99/3.20	5.40/5.49	6.64/6.95	5.35/5.59	7.49/6.76
Psic./ No Psi. ^(c)	3.85/2.33(*)	5.54/5.27	7.41/6.11(*)	4.93/5.83(*)	8.01/6.69(*)
Edad1/2/ 3 ^(d)	2.97/3.12/4.00	5.05/6.57/4.88(*)	6.27/7.96/7.25(*)	5.28/6.10/5.38	7.60/6.77/6.88
Estu.1/2/3 ^(e)	1.46/2.98/3.47	5.85/5.01/6.16	5.92/6.47/7.35(*)	4.46/5.53/5.46	5.38/7.36/7.72(*)
Hostil^(a)	3.60 (2.94)	6.40 (3.24)	8.33 (2.52)	3.90 (3.30)	5.25 (3.55)
Mujer/ Varón ^(b)	3.48/3.88	6.31/6.62	8.31/8.38	4.01/3.48	5.33/5.12
Psic./ No Psi. ^(c)	4.42/2.86(*)	6.53/6.26	8.94/7.80(*)	4.07/3.72	6.54/4.20(*)
Edad1/2/ 3 ^(d)	3.65/3.57/1.88	6.18/6.90/6.38	8.17/8.78/9.14	3.80/4.14/5.00	5.47/5.00/3.75
Estu.1/2/3 ^(e)	1.69/3.38/4.47(*)	6.00/6.29/6.67	7.33/8.22/8.76	5.08/3.58/4.53	4.15/5.14/5.88
Humillación^(a)	4.74 (3.33)	6.77 (3.07)	8.73 (2.05)	6.89 (3.23)	4.84 (3.59)
Mujer/ Varón ^(b)	4.81/4.49	6.58/7.50	8.74/8.67	6.79/7.29	4.84/4.74
Psic./ No Psi. ^(c)	5.27/4.30(*)	6.95/6.70	9.04/8.45(*)	6.65/7.14	4.43/5.15
Edad1/2/ 3 ^(d)	4.90/3.98/6.50	6.82/6.67/7.63	8.69/8.86/8.50	6.96/6.82/6.13	4.94/4.51/4.88
Estu.1/2/3 ^(e)	6.00/4.53/4.86	6.15/6.86/6.66	8.15/8.61/9.07	6.46/7.10/6.45	6.08/5.01/4.19
Ignorante^(a)	5.69 (3.46)	6.00 (3.52)	8.79 (2.03)	3.01 (3.40)	2.38 (2.99)
Mujer/ Varón ^(b)	5.75/5.44	5.80/5.76	8.86/8.58	2.79/3.76	2.23/2.86
Psic./ No Psi. ^(c)	6.03/5.37(*)	5.81/6.22	9.08/8.53(*)	2.54/3.46(*)	2.07/2.66
Edad1/2/ 3 ^(d)	5.88/4.73/8.00(*)	6.03/6.48/4.50	8.76/8.98/8.88	3.17/2.38/4.13	2.42/2.08/3.88
Estu.1/2/3 ^(e)	7.08/5.63/5.48	5.77/5.99/6.00	8.15/8.73/9.03	3.92/3.31/2.11(*)	4.38/2.53/1.54(*)
Imperfecto^(a)	4.94 (3.34)	6.10 (3.37)	8.65 (2.23)	4.46 (3.57)	3.91 (3.52)
Mujer/ Varón ^(b)	5.01/4.67	5.99/6.54	8.64/8.69	4.14/5.51(*)	3.81/4.29
Psic./ No Psi. ^(c)	5.33/4.57	5.97/6.23	8.88/8.45	4.69/4.26	3.86/3.97
Edad1/2/ 3 ^(d)	5.21/3.88/6.00(*)	6.99/6.57/6.50	8.66/8.80/8.63	4.58/4.08/4.38	3.81/4.20/5.25
Estu.1/2/3 ^(e)	5.08/4.82/5.10	6.77/5.94/6.19	8.31/8.61/8.78	4.08/4.43/4.47	5.46/3.94/3.52
Inadecuado^(a)	4.84 (3.22)	5.33 (3.48)	8.15 (2.48)	3.44 (3.31)	3.32 (3.23)
Mujer/ Varón ^(b)	4.79/4.88	5.04/6.34(*)	8.32/7.63	3.24/4.14	3.22/3.55(*)
Psic./ No Psi. ^(c)	5.45/4.28(*)	5.06/5.63	8.63/7.74(*)	3.69/3.25	3.56/3.10
Edad1/2/ 3 ^(d)	5.07/3.90/5.88	5.28/5.71/5.63	8.14/8.29/8.25	3.44/3.20/4.63	3.36/3.12/3.75
Estu.1/2/3 ^(e)	4.46/4.72/5.12	4.92/5.38/5.28	6.08/8.12/8.61(*)	4.31/3.23/3.55	3.69/3.27/3.38

	Frec. de uso	Imaginación	Comprensión	Depresión	Ansiedad
Inapetente ^(a)	2.90 (3.20)	5.38 (3.70)	3.71 (3.28)	6.54 (3.70)	2.93 (3.20)
Mujer/ Varón ^(b)	2.96/2.75	5.48/5.18	7.45/6.96	6.78/5.76	3.04/2.63
Psic./ No Psi. ^(c)	2.85/2.97	5.81/5.11	7.49/7.17	7.94/5.31(*)	3.04/2.88
Edad1/2/3 ^(d)	2.74/3.47/3.75	5.13/6.38/6.00	6.91/8.38/8.63(*)	6.54/6.55/5.38	2.78/3.49/2.13
Estu.1/2/3 ^(e)	3.54/2.75/3.05	5.54/5.08/6.02	6.54/7.13/7.76	4.77/6.29/7.55(*)	2.85/2.96/3.02
Incapacidad ^(a)	4.90 (3.31)	7.36 (2.99)	8.92 (1.90)	7.18 (3.16)	5.80 (3.64)
Mujer/ Varón ^(b)	5.13/4.12	7.41/7.22	8.96/8.76	7.33/6.71	5.77/5.94
Psic./ No Psi. ^(c)	5.27/4.59	7.30/7.46	8.98/8.85	7.48/6.90	5.52/6.05
Edad1/2/3 ^(d)	4.71/5.31/6.38	7.30/7.52/8.63	8.83/9.10/9.25	7.05/7.22/8.50	5.83/5.80/5.75
Estu.1/2/3 ^(e)	5.62/4.58/5.59	7.00/7.54/7.05	8.77/8.88/9.02	5.46/7.40/7.07	4.77/6.20/5.14
Incapaz ^(a)	5.91 (3.16)	6.36 (3.24)	8.70 (2.12)	6.22 (3.45)	4.87 (3.53)
Mujer/ Varón ^(b)	6.13/5.16(*)	6.40/6.33	8.82/8.29	6.07/6.78	4.09/4.88
Psic./ No Psi. ^(c)	6.38/5.49(*)	6.67/6.21	9.01/8.42(*)	6.49/6.00	4.76/5.02
Edad1/2/3 ^(d)	6.12/5.24/6.14	6.40/6.69/4.88	8.75/8.65/8.63	6.38/5.59/7.13	4.87/4.96/4.63
Estu.1/2/3 ^(e)	5.85/5.75/6.25	5.85/6.20/6.74	7.85/8.61/9.03	6.00/6.26/6.07	5.85/5.08/4.10(*)
Incómodo ^(a)	6.83 (2.78)	7.00 (2.99)	8.70 (2.01)	4.09 (3.45)	6.43 (3.43)
Mujer/ Varón ^(b)	7.05/6.10(*)	6.90/7.35	8.74/8.57	4.15/3.96	6.60/5.84
Psic./ No Psi. ^(c)	7.40/6.53(*)	7.24/6.81	9.21/8.26(*)	4.77/3.55(*)	7.26/5.68(*)
Edad1/2/3 ^(d)	6.99/6.39/7.25	7.01/7.14/7.00	8.69/8.82/8.25	4.36/3.61/2.88	6.75/5.37/5.63(*)
Estu.1/2/3 ^(e)	6.46/6.80/6.93	6.23/6.93/7.28	7.92/8.51/9.25(*)	2.69/4.09/4.57	5.31/6.51/6.52(*)
Incompetente ^(a)	5.33 (3.26)	6.51 (3.35)	8.53 (2.29)	5.30 (3.73)	4.34 (3.69)
Mujer/ Varón ^(b)	5.43/5.02	6.49/6.68	8.58/8.35	5.33/5.27	4.36/4.31
Psic./ No Psi. ^(c)	6.13/4.65(*)	6.51/6.55	9.02/8.10(*)	5.57/5.09	4.01/4.66
Edad1/2/3 ^(d)	5.63/4.29/5.75(*)	6.50/6.57/7.25	8.54/8.47/8.38	5.50/4.55/5.75	4.26/4.24/7.00
Estu.1/2/3 ^(e)	4.15/5.30/5.56	6.15/6.65/6.19	6.46/8.50/8.98(*)	4.54/5.54/4.88	5.46/4.67/3.17(*)
Indeciso ^(a)	6.33 (2.90)	6.97 (3.00)	8.73 (1.97)	5.79 (3.42)	6.24 (3.43)
Mujer/ Varón ^(b)	6.60/5.43(*)	6.84/7.44	8.77/8.61	5.69/6.08	6.20/6.29
Psic./ No Psi. ^(c)	6.81/5.91(*)	6.99/7.01	9.06/8.43(*)	6.38/5.31(*)	6.40/6.06
Edad1/2/3 ^(d)	6.47/5.63/7.88	7.04/7.25/5.38	8.80/8.54/8.13	6.03/5.27/4.88	6.20/6.53/3.88
Estu.1/2/3 ^(e)	5.92/6.14/6.78	6.67/6.96/7.09	6.75/8.70/9.14(*)	5.00/5.64/6.38	5.00/6.49/5.79
Indefenso ^(a)	5.51 (3.04)	7.05 (3.08)	8.86 (1.89)	6.70 (3.10)	5.56 (3.60)
Mujer/ Varón ^(b)	5.59/5.20	7.06/7.12	8.94/8.59	6.59/7.10	5.55/5.69
Psic./ No Psi. ^(c)	6.08/4.98	7.08/7.05	9.08/8.65	6.78/6.66	5.77/5.41
Edad1/2/3 ^(d)	5.58/4.85/7.50	7.07/6.98/7.50	8.77/9.04/9.00	6.94/5.94/7.38	5.84/5.10/4.13
Estu.1/2/3 ^(e)	6.50/5.27/5.80	6.75/6.95/7.24	9.00/8.67/9.20	6.33/6.80/6.47	4.54/5.53/5.90
Inepto ^(a)	3.54 (3.33)	5.21 (3.51)	7.31 (3.12)	3.83 (3.61)	2.95 (3.23)
Mujer/ Varón ^(b)	3.33/4.14	4.90/6.16(*)	7.26/7.47	3.75/4.18	2.88/3.24
Psic./ No Psi. ^(c)	3.98/3.11	5.33/5.08	7.85/6.82(*)	3.69/4.02	2.66/3.25
Edad1/2/3 ^(d)	3.44/3.51/4.86	4.99/6.10/4.25	7.01/7.92/8.50	3.77/3.73/6.13	2.92/2.94/4.00
Estu.1/2/3 ^(e)	3.46/3.33/3.93	5.17/5.01/5.51	6.15/7.01/8.14(*)	2.77/3.99/3.69	2.92/3.25/2.26
Inestabilidad ^(a)	4.82 (3.07)	6.12 (3.26)	8.67 (2.02)	7.40 (2.94)	7.79 (2.60)
Mujer/ Varón ^(b)	5.01/4.20	6.14/6.08	8.78/8.35	7.33/7.57	7.91/7.39
Psic./ No Psi. ^(c)	5.22/4.49	6.00/6.22	8.85/8.51	7.23/7.56	7.83/7.73
Edad1/2/3 ^(d)	4.81/4.73/6.25	5.90/6.94/5.88	8.49/9.33/8.13(*)	7.51/7.39/6.13	7.74/8.08/6.25
Estu.1/2/3 ^(e)	4.54/4.71/5.17	5.31/6.09/6.28	7.54/8.54/9.19(*)	6.69/7.57/7.29	7.00/8.05/7.31
Inferior ^(a)	5.99 (3.34)	5.73 (3.59)	8.49 (2.32)	6.27 (3.71)	3.84 (3.53)
Mujer/ Varón ^(b)	5.40/4.84	5.57/6.27	8.59/8.16	6.14/6.67	3.89/3.71
Psic./ No Psi. ^(c)	6.19/4.50	6.00/5.52	8.68/8.31	6.18/6.35	3.72/3.96
Edad1/2/3 ^(d)	5.70/4.06/5.14(*)	5.81/5.83/4.75	8.52/8.41/9.00	6.54/5.33/6.88	3.91/3.49/4.13
Estu.1/2/3 ^(e)	4.69/5.20/5.64(*)	4.50/5.72/5.89	8.08/8.34/8.86	4.85/6.39/6.19	4.08/3.93/3.55
Inmaduro ^(a)	5.31 (3.15)	6.19 (3.23)	8.58 (2.11)	2.70 (2.88)	3.21 (3.14)
Mujer/ Varón ^(b)	5.43/5.00	6.16/6.41	8.64/8.41	2.58/3.14	3.33/2.90
Psic./ No Psi. ^(c)	6.08/4.69(*)	6.48/6.04	9.10/8.13(*)	2.79/2.65	3.36/3.13
Edad1/2/3 ^(d)	5.53/4.45/6.25	6.05/6.88/5.88	8.56/8.57/9.25	2.70/2.63/4.13	3.54/2.43/3.00
Estu.1/2/3 ^(e)	4.69/5.20/5.62	6.31/6.05/6.53	8.08/8.35/9.19(*)	2.85/2.79/2.45	3.08/3.58/2.50

	Frec. de uso	Imaginación	Comprensión	Depresión	Ansiedad
Inoportuno^(a)	5.54 (3.09)	6.38 (3.39)	8.48 (2.39)	2.71 (2.91)	3.66 (3.43)
Mujer/ Varón ^(b)	5.58/5.37	6.31/6.68	8.48/8.45	2.61/3.02	3.61/3.84
Psic./ No Psí. ^(c)	6.01/5.15(*)	6.24/6.58	8.77/8.21	3.18/2.33(*)	3.94/3.45
Edad1/2/3 ^(d)	5.83/4.45/6.50(*)	6.34/6.57/7.25	8.41/8.86/8.13	2.81/2.33/2.25	3.89/2.96/4.63
Estu.1/2/3 ^(e)	5.31/5.63/5.31	6.15/6.43/6.28	7.92/8.33/8.88	3.00/2.64/2.79	4.23/3.99/2.90
Inquieto^(a)	6.70 (2.85)	7.71 (2.85)	8.82 (2.08)	3.27 (3.06)	8.38 (2.43)
Mujer/ Varón ^(b)	6.78/6.39	7.73/7.75	8.89/8.59	3.32/3.00	8.43/8.22
Psic./ No Psí. ^(c)	7.27/6.20(*)	8.23/7.32	9.20/8.48(*)	2.99/3.46	9.07/7.77(*)
Edad1/2/3 ^(d)	6.62/6.86/7.57	7.71/7.53/9.14	8.71/9.10/9.57	3.04/3.65/5.57	8.65/7.51/8.57(*)
Estu.1/2/3 ^(e)	6.42/6.52/7.19	7.25/7.61/8.00(*)	8.67/8.58/9.34	5.17/3.09/3.36	7.08/8.47/8.48(*)
Insatisfecho^(a)	5.58 (2.95)	6.67 (3.09)	8.72 (2.07)	7.04 (3.13)	6.57 (3.16)
Mujer/ Varón ^(b)	5.50/5.78	6.64/6.86	8.69/8.78	7.12/6.76	6.63/6.49
Psic./ No Psí. ^(c)	6.02/5.19(*)	6.85/6.58	9.06/8.41(*)	7.41/6.76	6.27/6.91
Edad1/2/3 ^(d)	5.68/5.00/6.88	6.61/7.20/5.38	8.67/8.78/9.13	7.19/6.76/6.25	6.61/6.76/5.75
Estu.1/2/3 ^(e)	6.15/5.50/5.56	5.85/6.63/6.93	8.23/8.55/9.15	5.92/7.04/7.36	7.15/6.85/5.78
Inseguro^(a)	6.56 (2.98)	6.94 (3.07)	8.90 (2.07)	6.90 (3.36)	7.42 (3.01)
Mujer/ Varón ^(b)	6.74/5.92	6.94/6.96	8.99/8.61	6.87/6.96	6.87/7.27
Psic./ No Psí. ^(c)	7.05/6.13(*)	7.05/6.85	9.20/8.64(*)	7.34/6.52	7.73/7.19
Edad1/2/3 ^(d)	6.79/5.82/6.71	7.07/7.02/5.00	8.95/8.61/9.63	6.89/6.90/7.00	7.62/7.11/5.38
Estu.1/2/3 ^(e)	5.62/6.44/6.98	6.92/6.89/6.98	8.31/8.88/9.02	5.00/6.99/7.23	7.46/7.69/6.77
Insomnio^(a)	5.68 (3.17)	7.82 (2.86)	9.03 (2.12)	6.77 (3.68)	7.77 (3.09)
Mujer/ Varón ^(b)	6.00/4.72(*)	7.88/7.58	9.07/8.88	7.18/5.48(*)	7.81/7.22
Psic./ No Psí. ^(c)	6.70/4.83(*)	8.32/7.35(*)	9.47/8.65(*)	7.44/6.20(*)	8.27/7.19(*)
Edad1/2/3 ^(d)	5.86/5.16/5.50	7.87/7.90/5.88	9.07/8.78/9.63	6.81/6.73/6.13	7.89/7.57/4.50(*)
Estu.1/2/3 ^(e)	3.23/5.64/6.32(*)	6.00/7.82/8.12(*)	7.69/9.04/9.28(*)	5.85/6.41/7.93(*)	5.92/8.04/7.40(*)
Intranquilo^(a)	6.64 (3.10)	7.74 (2.83)	9.13 (1.67)	5.40 (3.52)	8.96 (2.09)
Mujer/ Varón ^(b)	6.99/5.53(*)	7.70/7.88	9.13/9.10	5.63/4.65	8.96/8.94
Psic./ No Psí. ^(c)	6.89/6.46	7.95/7.62	9.34/8.93	5.23/5.50	9.41/8.57(*)
Edad1/2/3 ^(d)	6.64/6.69/8.25	7.79/7.69/8.38	9.16/9.12/8.75	5.21/5.86/6.00	9.09/8.55/8.99
Estu.1/2/3 ^(e)	6.92/6.45/7.17	7.00/7.72/8.02	8.54/9.10/9.29	6.00/5.44/5.22	8.69/8.94/9.21
Inútil^(a)	6.15 (3.29)	6.64 (3.24)	8.91 (2.11)	6.18 (3.53)	3.81 (3.51)
Mujer/ Varón ^(b)	6.18/6.02	6.52/7.10	8.93/8.86	6.31/5.75	3.94/3.47
Psic./ No Psí. ^(c)	6.78/5.61(*)	6.79/6.58	9.26/8.61(*)	6.97/5.49(*)	3.18/4.39(*)
Edad1/2/3 ^(d)	6.36/5.39/7.00	6.54/7.04/7.25	8.92/8.80/9.25	6.24/5.98/6.38	3.87/3.69/4.75
Estu.1/2/3 ^(e)	6.46/5.90/6.64	6.54/6.50/6.97	8.15/8.82/9.24	6.08/6.00/6.50	4.92/4.21/2.76(*)
Irritable^(a)	5.36 (3.02)	7.22 (3.92)	8.82 (2.13)	5.40 (3.71)	8.09 (2.70)
Mujer/ Varón ^(b)	5.64/4.43(*)	7.12/7.55	8.93/8.49	5.51/4.98	8.17/7.86
Psic./ No Psí. ^(c)	6.13/4.69(*)	7.59/6.94	9.33/8.39(*)	5.31/5.42	8.56/7.69(*)
Edad1/2/3 ^(d)	5.37/5.53/3.75	7.19/7.39/7.50	8.72/9.24/8.88	5.24/5.92/5.50	8.20/7.88/8.63
Estu.1/2/3 ^(e)	5.23/5.03/6.07	6.38/7.07/7.74	8.23/8.64/9.34	5.85/5.45/5.28	7.69/8.17/8.16
Lento^(a)	7.17 (2.80)	7.42 (3.07) ⁱ	8.98 (2.07)	5.05 (3.91)	1.71 (2.55)
Mujer/ Varón ^(b)	7.33/6.63	7.36/7.61	9.07/8.69	5.16/4.71	1.60/2.08
Psic./ No Psí. ^(c)	7.75/6.67(*)	7.86/7.07	9.40/8.61(*)	6.75/3.58(*)	1.67/1.75
Edad1/2/3 ^(d)	7.41/6.29/8.13(*)	7.46/7.35/7.75	8.99/8.78/9.50	5.17/4.65/3.13	1.76/1.63/0.88
Estu.1/2/3 ^(e)	7.00/7.09/7.36	6.62/7.34/7.79	8.15/8.93/9.24	3.85/4.64/6.26(*)	2.08/1.75/1.59
Llanto^(a)	5.92 (3.43)	8.47 (2.57)	9.14 (1.76)	8.24 (2.72)	5.87 (3.38)
Mujer/ Varón ^(b)	6.07/5.38	8.64/7.88	9.23/8.86	8.36/7.84	5.91/5.84
Psic./ No Psí. ^(c)	6.63/5.29(*)	8.92/8.06(*)	9.40/8.92(*)	9.11/7.50(*)	5.91/5.88
Edad1/2/3 ^(d)	6.11/5.56/5.00	8.55/8.44/7.75	9.07/9.33/9.25	8.39/8.14/7.25	6.19/5.53/3.38(*)
Estu.1/2/3 ^(e)	4.38/5.85/6.47	7.77/8.48/8.57	8.92/9.06/9.37	8.31/8.00/8.72	4.38/6.49/4.79(*)
Lloroso^(a)	5.75 (3.29)	7.98 (2.88)	8.95 (2.08)	8.31 (2.57)	4.23 (3.49)
Mujer/ Varón ^(b)	6.01/4.90(*)	8.11/7.53	9.04/8.67	8.47/7.80	4.23/4.32
Psic./ No Psí. ^(c)	6.16/5.39	8.38/7.62(*)	9.07/8.84	8.75/7.93(*)	3.56/4.83(*)
Edad1/2/3 ^(d)	5.79/5.63/6.88	8.15/7.57/8.00	8.93/8.90/9.50	8.44/7.96/7.63	4.06/5.06/3.68
Estu.1/2/3 ^(e)	6.46/5.41/6.49	6.92/7.97/8.22	9.23/8.93/8.93	7.85/8.18/8.67	4.62/4.47/3.69

	Frec. de uso	Imaginación	Comprensión	Depresión	Ansiedad
Mareado ^(a)	6.46 (3.14)	7.50 (3.06)	8.79 (2.19)	3.85 (3.33)	4.21 (3.41)
Mujer/ Varón ^(b)	6.65/5.80	7.57/7.24	8.86/8.57	3.87/3.84	4.47/3.51
Psic./ No Psi. ^(c)	7.28/5.73(*)	7.94/7.09(*)	9.08/8.53	4.40/3.42(*)	4.69/3.81
Edad1/2/3 ^(d)	6.73/5.55/7.63(*)	7.57/7.45/7.43	8.79/8.88/9.13	4.02/3.51/3.75	4.32/3.73/4.88
Estu.1/2/3 ^(e)	6.92/6.27/6.80	7.08/7.38/7.74	8.54/8.68/9.03	3.85/3.78/4.14	5.46/3.81/4.91(*)
Mareo ^(a)	6.38 (3.30)	7.59 (3.01)	8.79 (2.15)	3.79 (3.40)	4.95 (3.56)
Mujer/ Varón ^(b)	6.61/5.63	7.62/7.58	8.87/8.53	3.80/3.84	5.07/4.69
Psic./ No Psi. ^(c)	7.20/5.67(*)	7.98/7.29	9.21/8.42(*)	4.47/3.27(*)	5.77/4.27(*)
Edad1/2/3 ^(d)	6.69/5.13/8.63(*)	7.64/7.77/6.88	8.80/8.98/8.50	3.95/3.67/2.88	5.07/4.82/5.00
Estu.1/2/3 ^(e)	7.77/6.28/6.29	6.54/7.53/7.90	8.00/8.71/9.12	3.69/3.76/4.03	5.46/4.46/6.10
Miedo ^(a)	7.33 (2.88)	8.11 (2.69)	9.11 (1.80)	6.02 (3.55)	8.87 (2.05)
Mujer/ Varón ^(b)	7.57/6.57(*)	8.13/8.18	9.14/9.04	6.27/5.27	8.90/8.76
Psic./ No Psi. ^(c)	7.76/6.96(*)	8.28/8.02	9.24/9.00	5.54/6.42	9.16/8.61
Edad1/2/3 ^(d)	7.54/6.82/7.25	8.20/8.19/7.75	9.02/9.41/9.13	5.97/6.31/5.25	8.97/8.82/7.00
Estu.1/2/3 ^(e)	7.69/7.18/7.61	7.15/8.15/8.18	8.77/9.05/9.29	6.77/5.84/6.29	7.23/8.37/9.40
Miedoso ^(a)	6.59 (3.11)	7.64 (2.82)	8.83 (2.12)	5.51 (3.62)	7.70 (2.84)
Mujer/ Varón ^(b)	6.81/5.84(*)	7.72/7.37	8.84/8.78	5.56/5.41	7.92/7.02(*)
Psic./ No Psi. ^(c)	7.03/6.20(*)	7.71/7.58	9.26/8.46(*)	5.22/5.79	8.27/7.20(*)
Edad1/2/3 ^(d)	6.87/5.94/6.71	7.62/7.73/8.38	8.93/8.63/9.13	5.52/5.57/5.50	7.91/7.37/5.63(*)
Estu.1/2/3 ^(e)	5.92/6.58/6.83	7.69/7.58/7.72	7.62/8.77/9.19(*)	6.08/5.55/5.36	5.85/7.76/7.98(*)
Molestia ^(a)	6.39 (3.01)	6.36 (3.28)	8.76 (1.97)	5.51 (3.36)	5.80 (3.40)
Mujer/ Varón ^(b)	6.52/5.96	6.21/6.96	8.82/8.61	5.67/5.10	5.90/5.57
Psic./ No Psi. ^(c)	6.82/6.03(*)	6.47/6.35	8.86/8.68	6.19/4.94(*)	6.32/5.37(*)
Edad1/2/3 ^(d)	6.41/6.14/8.25	6.46/6.55/5.63	8.67/9.16/8.63	5.71/4.80/6.38	6.03/5.23/4.75
Estu.1/2/3 ^(e)	8.00/6.02/6.93	6.77/6.24/6.52	8.08/8.68/9.07	4.92/5.17/6.55(*)	6.31/5.55/6.33
Molesto ^(a)	6.17 (2.95)	6.49 (3.09)	8.56 (2.22)	4.47 (3.40)	5.86 (3.17)
Mujer/ Varón ^(b)	6.26/5.88	6.43/6.76	8.55/8.57	4.66/3.80	6.07/5.14
Psic./ No Psi. ^(c)	6.64/5.79	6.50/6.55	8.64/8.46	4.72/4.25	6.25/5.50
Edad1/2/3 ^(d)	6.20/5.90/7.88	6.33/6.86/7.88	8.34/9.10/8.88	4.54/4.44/3.25	6.13/5.24/3.63(*)
Estu.1/2/3 ^(e)	7.38/5.91/6.53(*)	6.54/6.45/6.55	7.77/8.50/8.79	3.92/4.35/4.99	4.54/5.98/5.78
Muerte ^(a)	6.25 (3.49)	8.31 (2.86)	8.88 (2.43)	7.72 (3.18)	6.88 (3.61)
Mujer/ Varón ^(b)	6.35/5.86	8.32/8.24	8.99/8.47	7.76/7.55	7.02/6.55
Psic./ No Psi. ^(c)	6.82/5.74(*)	8.93/7.76(*)	9.33/8.46(*)	8.22/7.25(*)	6.83/6.96
Edad1/2/3 ^(d)	6.75/4.73/5.86(*)	8.30/8.59/8.13	8.89/9.02/8.00	7.83/7.31/7.13	7.31/6.08/4.88(*)
Estu.1/2/3 ^(e)	5.54/6.31/6.17	7.31/8.15/8.86	8.46/8.70/9.29	6.46/7.77/7.93	5.31/7.19/6.40
Mutilado ^(a)	3.31 (3.35)	7.78 (3.06)	8.76 (2.27)	6.54 (3.54)	5.05 (3.75)
Mujer/ Varón ^(b)	3.37/3.08	7.82/7.62	8.79/8.64	6.75/5.86	5.03/5.24
Psic./ No Psi. ^(c)	3.57/3.10	8.31/7.33(*)	9.09/8.46(*)	6.29/6.79	4.44/5.64(*)
Edad1/2/3 ^(d)	3.18/3.43/5.75	7.68/7.96/8.75	8.62/9.25/8.25	6.81/5.71/7.13	5.31/4.46/5.13
Estu.1/2/3 ^(e)	3.85/3.10/3.77	7.38/7.63/8.16	8.38/8.67/9.00	5.85/7.15/5.32	3.77/5.73/3.82(*)
Nervioso ^(a)	7.99 (2.56)	8.28 (2.33)	9.00 (1.84)	4.24 (3.54)	8.96 (2.00)
Mujer/ Varón ^(b)	8.23/7.22(*)	8.35/8.08	9.11/8.63	4.37/3.80	8.95/8.98
Psic./ No Psi. ^(c)	8.29/7.75	8.45/8.13	9.17/8.83	4.00/4.42	9.23/8.72
Edad1/2/3 ^(d)	8.13/7.47/8.88	8.35/8.14/8.25	9.03/9.04/8.63	4.04/4.80/4.13	9.10/8.16/9.25(*)
Estu.1/2/3 ^(e)	7.62/7.94/8.19	7.69/8.26/8.41	8.69/8.96/9.09	4.54/4.34/3.93	7.92/8.29/8.41(*)
Odioso ^(a)	4.63 (3.22)	6.00 (3.40)	8.44 (2.45)	3.44 (3.41)	4.01 (3.43)
Mujer/ Varón ^(b)	4.77/4.16	5.99/6.16	8.43/8.50	3.38/3.70	3.98/4.16
Psic./ No Psi. ^(c)	5.10/4.22(*)	6.29/5.84	8.82/8.11(*)	3.45/3.47	4.00/4.06
Edad1/2/3 ^(d)	4.78/3.90/6.38	5.96/6.18/6.63	8.40/8.53/8.50	3.74/2.65/2.63	4.18/3.29/6.38(*)
Estu.1/2/3 ^(e)	4.08/4.61/4.69	6.15/6.00/5.95	6.38/8.41/8.88(*)	2.31/3.61/3.28	5.00/4.30/3.26
Ofendido ^(a)	5.86 (2.92)	6.39 (3.22)	8.71 (2.09)	4.72 (3.49)	4.53 (3.43)
Mujer/ Varón ^(b)	5.92/5.63	6.08/7.41(*)	8.67/8.86	4.68/4.94	4.77/3.80
Psic./ No Psi. ^(c)	6.13/5.63	6.38/6.47	9.00/8.46	5.16/4.38	4.66/4.46
Edad1/2/3 ^(d)	6.02/5.20/7.13	6.46/6.33/6.75	8.69/8.82/9.13	5.07/3.85/4.00	4.74/4.16/3.88
Estu.1/2/3 ^(e)	5.67/5.83/5.92	5.58/6.35/6.60	7.15/8.74/8.95(*)	3.15/4.85/4.78	4.69/4.80/3.81

	Frec. de uso	Imaginación	Comprensión	Depresión	Ansiedad
Palpitación ^(a)	4.43 (3.24)	6.91 (3.37)	8.64 (2.34)	3.57 (3.24)	9.01 (1.95)
Mujer/Varón ^(b)	4.63/3.80	6.87/7.04	8.73/8.35	3.60/3.55	9.14/8.67
Psic./No Psic. ^(c)	5.27/3.72(*)	7.71/6.20(*)	9.14/8.20(*)	3.20/3.90	9.65/8.49(*)
Edad1/2/3 ^(d)	4.30/4.67/5.88	7.09/6.76/5.63	8.67/8.63/9.00	3.31/4.38/3.63	9.14/8.69/8.50
Estu.1/2/3 ^(e)	3.92/4.20/5.08	4.54/6.80/7.59(*)	6.54/8.61/9.14(*)	3.38/3.63/3.56	7.46/9.04/9.33(*)
Pánico ^(a)	5.24 (3.18)	7.32 (2.93)	8.68 (2.25)	4.77 (3.66)	8.82 (2.30)
Mujer/Varón ^(b)	5.33/4.92	7.30/7.49	8.61/8.88	4.81/4.67	8.92/8.49
Psic./No Psic. ^(c)	6.09/4.50(*)	7.52/7.18	8.85/8.52	3.99/5.45(*)	9.14/8.54
Edad1/2/3 ^(d)	5.44/4.33/6.75(*)	7.23/7.53/8.50	8.63/8.86/8.38	4.91/4.41/5.00	9.02/8.45/7.13(*)
Estu.1/2/3 ^(e)	4.92/5.18/5.36	6.45/7.23/7.59	8.23/8.66/8.78	5.23/5.07/4.07	6.92/8.96/8.90(*)
Paralizado ^(a)	4.40 (3.27)	7.15 (2.98)	8.55 (2.28)	4.99 (3.78)	4.89 (3.86)
Mujer/Varón ^(b)	4.48/4.10	7.11/7.24	8.67/8.16	5.03/4.96	5.14/4.16
Psic./No Psic. ^(c)	5.23/3.65(*)	7.59/6.75	8.83/8.28	5.35/4.74	5.57/4.32(*)
Edad1/2/3 ^(d)	4.42/3.79/7.25(*)	6.85/7.05/7.43	8.41/9.00/8.13	5.15/5.00/2.88	4.98/4.69/5.38
Estu.1/2/3 ^(e)	4.85/4.19/4.66	7.12/7.10/7.50	8.00/8.40/8.93	5.38/4.85/5.29	4.15/4.49/5.95(*)
Patético ^(a)	3.55 (3.23)	5.27 (3.26)	7.75 (2.57)	6.11 (3.24)	4.83 (3.39)
Mujer/Varón ^(b)	3.59/3.44	5.15/5.72	7.74/7.78	6.18/6.02	4.87/4.76
Psic./No Psic. ^(c)	4.18/3.06(*)	5.34/5.27	8.09/7.45	6.53/5.81	4.74/4.92
Edad1/2/3 ^(d)	3.78/2.94/3.75	5.28/5.53/4.83	7.71/7.88/8.25	6.21/6.02/6.50	5.30/3.53/3.25(*)
Estu.1/2/3 ^(e)	3.31/3.41/4.02	4.50/5.19/5.53	6.69/7.68/8.05	5.54/6.33/5.81	3.08/5.18/4.38(*)
Peligro ^(a)	6.84 (3.07)	8.17 (2.61)	8.99 (2.06)	3.12 (3.25)	7.00 (3.44)
Mujer/Varón ^(b)	7.00/6.26	8.17/8.12	9.07/8.68	3.18/2.98	7.17/6.46
Psic./No Psic. ^(c)	7.41/6.33(*)	8.40/7.94	9.33/8.68(*)	3.37/2.92	7.84/6.27(*)
Edad1/2/3 ^(d)	7.03/6.41/6.00	8.19/8.12/7.63	8.88/9.27/8.63	2.97/3.69/3.38	7.53/5.80/5.63(*)
Estu.1/2/3 ^(e)	6.23/6.69/7.29	6.77/8.25/8.19	8.46/8.92/9.20	4.46/2.93/3.31	6.00/7.22/6.81
Peor ^(a)	7.10 (3.29)	5.24 (3.63)	8.70 (2.30)	6.26 (3.55)	4.69 (3.49)
Mujer/Varón ^(b)	7.23/6.66	4.99/6.06	8.80/8.39	6.43/5.76	4.71/4.73
Psic./No Psic. ^(c)	7.75/6.57(*)	4.60/5.84(*)	8.93/8.50	7.11/5.52(*)	5.15/4.30
Edad1/2/3 ^(d)	7.37/6.15/8.75(*)	5.21/5.20/7.63	8.75/8.63/9.25	6.32/6.24/5.38	4.79/4.42/5.00
Estu.1/2/3 ^(e)	8.08/6.74/7.71	6.15/5.08/5.38	8.23/8.48/9.27	4.62/6.09/7.05(*)	3.69/4.80/4.64
Perplejo ^(a)	3.61 (2.97)	5.66 (3.34)	7.74 (2.66)	2.89 (2.96)	3.56 (2.98)
Mujer/Varón ^(b)	3.58/3.66	5.72/5.52	7.84/7.40	2.91/2.88	3.76/2.96
Psic./No Psic. ^(c)	3.91/3.37	5.67/5.71	8.01/7.49	3.41/2.47	3.88/3.33
Edad1/2/3 ^(d)	3.66/3.45/3.88	5.59/5.92/6.25	7.56/8.18/8.63	3.16/2.22/2.13	3.70/3.22/3.63
Estu.1/2/3 ^(e)	3.23/3.66/3.54	5.62/5.55/5.86	7.38/7.46/8.36	2.31/2.88/3.09	4.00/3.44/3.83
Perseguido ^(a)	4.69 (3.23)	7.96 (2.78)	8.88 (2.21)	4.20 (3.46)	8.36 (2.72)
Mujer/Varón ^(b)	4.84/4.14	8.11/7.61	8.95/8.63	4.27/4.10	8.56/7.78
Psic./No Psic. ^(c)	5.65/3.88(*)	8.42/7.62(*)	9.15/8.63	3.82/4.58	8.56/8.27
Edad1/2/3 ^(d)	4.81/4.22/5.00	8.07/7.71/8.13	8.77/9.24/9.00	4.24/4.25/5.38	8.64/7.90/7.13
Estu.1/2/3 ^(e)	4.31/4.42/5.39	6.38/7.99/8.19	8.15/8.72/9.36	4.46/4.26/4.19	6.85/8.77/7.86(*)
Pobre ^(a)	7.07 (2.84)	8.20 (2.71)	9.04 (2.11)	4.39 (3.68)	3.35 (3.44)
Mujer/Varón ^(b)	7.27/6.39	8.18/8.24	9.03/9.04	4.32/4.69	3.33/3.39
Psic./No Psic. ^(c)	7.66/6.57(*)	8.51/7.90	9.31/8.79	4.17/4.64	3.28/3.42
Edad1/2/3 ^(d)	7.27/6.27/8.50(*)	8.21/8.12/8.38	9.13/9.02/8.13	4.78/3.27/4.88(*)	3.71/2.67/1.63
Estu.1/2/3 ^(e)	7.85/6.88/7.34	7.69/8.18/8.28	8.62/9.02/9.12	5.00/4.75/3.34(*)	4.00/3.68/2.50
Preocupación ^(a)	7.52 (2.46)	7.33 (2.98)	9.12 (1.76)	7.11 (3.27)	8.35 (2.30)
Mujer/Varón ^(b)	7.72/6.86(*)	7.30/7.51	9.21/8.80	7.35/6.37	8.44/8.06
Psic./No Psic. ^(c)	7.88/7.23(*)	7.26/7.47	9.42/8.85(*)	7.48/6.77	8.52/8.19
Edad1/2/3 ^(d)	7.47/7.43/9.38	7.28/7.82/7.63	9.09/9.16/9.50	7.08/7.02/7.50	8.38/8.54/6.75
Estu.1/2/3 ^(e)	8.69/7.33/7.69	7.62/7.34/7.22	8.69/9.02/9.39	5.92/6.98/7.72	7.54/8.34/8.47
Preocupado ^(a)	7.67 (2.61)	7.99 (2.52)	9.18 (1.58)	6.85 (3.29)	8.06 (2.40)
Mujer/Varón ^(b)	7.89/6.96(*)	8.03/7.86	9.26/8.94	6.87/6.76	8.11/7.88
Psic./No Psic. ^(c)	8.03/7.38	8.21/7.82	9.25/9.11	7.23/6.50	8.23/7.90
Edad1/2/3 ^(d)	7.79/7.29/8.75	8.01/8.10/8.50	9.17/9.24/9.13	6.80/6.78/7.25	7.99/8.33/7.50
Estu.1/2/3 ^(e)	8.38/7.44/8.03	7.85/7.90/8.23	8.77/9.14/9.32	6.15/6.63/7.50	7.85/8.04/8.17

	Frec. de uso	Imaginación	Comprensión	Depresión	Ansiedad
Problemático^(a)	5.61 (3.04)	6.25 (3.18)	8.50 (2.10)	5.72 (3.48)	6.32 (3.31)
Mujer/Varón ^(b)	5.61/5.59	6.16/6.57	8.56/8.35	5.83/5.43	6.66/5.22(*)
Psic./No Psi. ^(c)	6.09/5.20(*)	6.27/6.29	8.91/8.16(*)	5.88/5.62	6.91/5.83(*)
Edad1/2/3 ^(d)	5.59/5.63/6.00	6.10/6.67/6.88	8.51/8.59/7.88	5.87/5.69/4.50	6.48/5.92/6.25
Estu.1/2/3 ^(e)	5.62/5.34/6.20	6.33/6.14/6.43	6.54/8.42/9.05(*)	4.23/5.94/5.74	6.08/6.53/6.07
Rechazado^(a)	5.36 (3.05)	6.90 (3.05)	8.80 (1.98)	8.10 (2.57)	5.70 (3.55)
Mujer/Varón ^(b)	5.52/4.80	6.89/6.94	8.81/8.75	8.03/8.35	5.84/5.37
Psic./No Psi. ^(c)	5.84/4.93(*)	7.09/6.75	8.99/8.62	8.41/7.86	5.75/5.73
Edad1/2/3 ^(d)	5.49/4.52/7.13(*)	6.83/7.38/5.63	8.76/9.02/8.75	8.26/8.02/6.38	5.72/6.06/4.75
Estu.1/2/3 ^(e)	6.31/5.28/5.32	5.77/6.88/7.21	8.15/8.76/8.97	7.00/8.32/7.88	4.15/6.08/5.22
Ridículo^(a)	5.11 (3.20)	7.36 (2.88)	8.61 (2.29)	6.43 (3.48)	5.83 (3.80)
Mujer/Varón ^(b)	5.12/5.02	7.42/7.22	8.62/8.56	6.33/6.84	5.90/5.57
Psic./No Psi. ^(c)	5.52/4.73	7.66/7.12	8.98/8.27(*)	6.00/6.86	5.75/5.88
Edad1/2/3 ^(d)	5.33/4.10/6.88(*)	7.41/7.12/8.13	8.65/8.24/9.63	6.61/5.92/6.63	6.06/5.18/4.88(*)
Estu.1/2/3 ^(e)	5.46/4.99/5.22	6.77/7.35/7.45	8.00/8.49/8.93	6.69/6.67/5.78	5.08/6.21/5.14
Rubor^(a)	4.99 (3.17)	7.91 (2.88)	8.52 (2.44)	2.84 (3.05)	6.17 (3.69)
Mujer/Varón ^(b)	5.00/4.88	8.02/7.51	8.67/8.02	3.00/2.41	6.55/4.90(*)
Psic./No Psi. ^(c)	5.56/4.49(*)	8.49/7.39	8.95/8.13(*)	2.94/2.78	7.09/5.34
Edad1/2/3 ^(d)	5.21/4.49/4.25	8.08/7.84/5.63	8.49/8.63/8.25	2.90/2.73/1.88	6.58/4.96/4.38(*)
Estu.1/2/3 ^(e)	4.15/4.82/5.53	5.77/7.88/8.36(*)	7.15/8.45/8.92	1.77/3.11/2.50	4.92/6.41/5.78
Simple^(a)	6.04 (3.28)	5.07 (3.61)	8.66 (2.25)	1.84 (2.59)	1.56 (2.24)
Mujer/Varón ^(b)	6.18/5.55	4.81/5.98(*)	8.69/8.53	1.91/1.65	1.50/1.78
Psic./No Psi. ^(c)	6.46/5.66	4.68/5.48	8.70/8.61	2.10/1.64	1.66/1.50
Edad1/2/3 ^(d)	6.33/5.33/5.38	4.91/5.82/5.13	8.60/9.00/9.13	1.87/1.55/3.25	1.52/1.67/1.25
Estu.1/2/3 ^(e)	5.54/5.88/6.52	4.38/5.02/5.28	9.31/8.36/9.17(*)	2.31/1.80/1.90	1.77/1.49/1.67
Sobresalto^(a)	5.29 (2.74)	7.57 (2.56)	8.60 (2.09)	2.72 (2.81)	8.08 (2.62)
Mujer/Varón ^(b)	5.34/5.10	7.50/7.78	8.63/8.49	2.71/2.78	8.25/7.53
Psic./No Psi. ^(c)	5.48/5.11	7.67/7.46	8.85/8.37	2.65/2.80	8.63/7.61(*)
Edad1/2/3 ^(d)	5.28/5.06/5.63	7.59/7.63/7.13	8.58/8.83/8.50	2.63/3.08/2.00	8.28/7.61/7.00
Estu.1/2/3 ^(e)	6.00/5.24/5.22	7.08/7.53/7.67	7.77/8.60/8.71	3.38/2.77/2.53	7.31/8.19/7.98
Sofoco^(a)	5.37 (3.07)	7.51 (2.84)	8.48 (2.36)	2.93 (2.95)	7.19 (3.15)
Mujer/Varón ^(b)	5.46/5.06	7.48/7.59	8.51/8.37	2.87/3.20	7.31/6.78
Psic./No Psi. ^(c)	5.92/4.92(*)	8.18/6.93	8.88/8.13(*)	2.78/3.08	8.13/6.36(*)
Edad1/2/3 ^(d)	5.57/4.82/5.75	7.63/7.22/6.75	8.43/8.47/8.88	2.92/3.15/1.63	7.64/5.90/6.00(*)
Estu.1/2/3 ^(e)	5.23/5.20/5.81	4.54/7.53/8.05(*)	7.46/8.43/8.76	2.77/3.02/2.76	5.38/7.20/7.59(*)
Solitario^(a)	6.50 (2.87)	8.48 (2.45)	9.33 (1.51)	7.99 (2.86)	4.76 (3.56)
Mujer/Varón ^(b)	6.64/6.02	8.47/8.47	9.36/9.25	8.05/7.76	4.84/4.59
Psic./No Psi. ^(c)	6.94/6.11(*)	8.69/8.28	9.36/9.30	8.47/7.57(*)	4.22/5.27(*)
Edad1/2/3 ^(d)	6.62/5.94/7.75	8.52/8.24/8.63	9.23/9.63/9.38	7.96/8.04/7.25	4.60/5.52/4.13
Estu.1/2/3 ^(e)	6.15/6.38/6.85	7.23/8.58/8.47	9.23/9.30/9.41	7.08/8.08/7.91	5.08/4.91/4.35
Sudor^(a)	7.21 (2.98)	8.28 (2.72)	8.94 (2.79)	2.79 (3.06)	7.21 (3.50)
Mujer/Varón ^(b)	7.31/6.84	8.29/8.26	8.91/9.02	2.75/2.96	7.26/7.02
Psic./No Psi. ^(c)	7.82/6.68(*)	9.12/7.58(*)	9.28/8.63(*)	2.89/2.73	8.59/6.00(*)
Edad1/2/3 ^(d)	7.41/6.71/6.88	8.42/7.92/8.63	9.01/8.78/9.38	2.61/3.51/2.13	7.56/6.47/5.13(*)
Estu.1/2/3 ^(e)	7.23/7.01/7.66	6.54/8.31/8.58	8.00/8.93/9.12	3.62/2.53/3.31	4.46/7.18/8.14(*)
Sudoroso^(a)	5.53 (3.23)	7.92 (2.35)	8.78 (2.20)	2.97 (2.98)	7.08 (3.56)
Mujer/Varón ^(b)	5.53/5.44	7.98/7.68	8.76/8.82	3.03/2.82	7.35/6.16(*)
Psic./No Psi. ^(c)	6.31/4.82(*)	8.69/7.22(*)	9.33/8.28(*)	2.96/3.00	8.66/5.70(*)
Edad1/2/3 ^(d)	5.48/5.37/8.00	7.88/8.06/8.00	8.84/8.65/8.50	2.86/3.33/2.50	7.24/6.65/5.75
Estu.1/2/3 ^(e)	6.46/5.15/6.26(*)	6.23/7.93/8.18	7.08/8.73/9.22(*)	2.92/2.80/3.40	5.69/6.88/7.95(*)
Suicida^(a)	4.77 (3.34)	7.83 (2.99)	8.98 (2.24)	8.62 (2.55)	6.63 (3.55)
Mujer/Varón ^(b)	4.68/4.98	7.86/7.68	9.01/8.86	8.69/8.40	6.82/6.43
Psic./No Psi. ^(c)	5.46/4.14(*)	8.49/7.22(*)	9.47/8.55(*)	8.52/8.71	5.98/7.40(*)
Edad1/2/3 ^(d)	4.88/4.22/5.50	7.78/7.84/7.50	8.99/8.86/9.25	8.59/8.92/8.13	6.56/7.27/7.25
Estu.1/2/3 ^(e)	3.62/4.73/5.03	6.46/7.91/7.82	6.85/9.03/9.29(*)	8.31/8.62/8.67	7.15/7.28/5.41(*)

	Frec. de uso	Imaginación	Comprensión	Depresión	Ansiedad
Suicidio^(a)	4.86 (3.54)	8.36 (2.69)	9.21 (2.19)	9.43 (1.72)	7.44 (3.36)
Mujer/ Varón ^(b)	4.89/4.67	8.37/8.27	9.24/9.12	9.45/9.35	7.58/7.14
Psic./ No Psi. ^(c)	5.51/4.28(*)	8.69/8.04	9.69/8.80(*)	9.65/9.24	6.75/8.12
Edad1/2/ 3 ^(d)	4.97/4.35/5.38	8.44/7.88/9.00	9.13/9.35/9.88	9.41/9.59/9.38	7.36/7.92/7.00
Estu.1/2/3 ^(e)	3.69/4.72/5.34	8.54/8.42/8.09	8.69/9.11/9.54	9.54/9.36/9.53	7.62/7.92/6.30(*)
Taquicardia^(a)	4.81 (3.25)	6.05 (3.55)	8.13 (2.70)	3.51 (3.31)	8.37 (2.66)
Mujer/ Varón ^(b)	3.86/3.58	6.06/6.13	8.26/7.70	3.50/3.58	8.41/8.22
Psic./ No Psi. ^(c)	4.70/2.99(*)	6.88/5.36(*)	8.64/7.68(*)	2.83/4.13(*)	9.13/7.71(*)
Edad1/2/ 3 ^(d)	3.75/3.67/5.25	5.73/7.00/6.50	7.91/8.65/9.00	3.28/4.35/4.13	8.47/8.04/8.25
Estu.1/2/3 ^(e)	3.00/3.46/4.70(*)	5.00/5.78/6.79	6.69/7.93/8.83(*)	2.46/3.91/2.95	6.38/8.39/8.74(*)
Temboroso^(a)	4.51 (3.30)	7.65 (2.88)	8.83 (2.09)	5.51 (3.41)	7.97 (2.73)
Mujer/ Varón ^(b)	4.65/4.00	7.71/7.43	8.93/8.51	5.66/5.14	8.16/7.31
Psic./ No Psi. ^(c)	5.39/3.74(*)	8.40/7.00(*)	9.18/8.53(*)	5.36/5.67	8.58/7.41(*)
Edad1/2/ 3 ^(d)	4.51/4.40/5.88	7.70/7.73/7.38	8.78/9.20/8.50	5.66/5.42/4.88	8.01/7.67/8.13
Estu.1/2/3 ^(e)	4.77/4.18/5.29	7.00/7.36/8.45(*)	7.46/8.74/9.34(*)	6.77/5.60/5.14	7.69/7.99/8.07
Tensión^(a)	6.25 (2.91)	7.05 (2.95)	8.80 (1.87)	4.95 (3.56)	9.16 (1.79)
Mujer/ Varón ^(b)	6.40/5.76	7.00/7.29	8.89/8.47	5.12/4.37	9.38/8.43(*)
Psic./ No Psi. ^(c)	6.96/5.66(*)	7.20/6.95	9.03/8.58	4.56/5.23	9.48/8.87(*)
Edad1/2/ 3 ^(d)	6.20/6.31/6.75	7.04/7.39/6.88	8.69/9.14/8.63	5.00/4.85/4.63	9.30/8.82/8.25
Estu.1/2/3 ^(e)	6.08/6.09/6.58	6.31/6.89/7.47	7.92/8.75/9.03	5.54/4.91/4.98	8.77/9.23/9.10
Tenso^(a)	6.10 (2.93)	6.94 (3.03)	8.56 (2.20)	4.13 (3.40)	8.48 (2.38)
Mujer/ Varón ^(b)	6.23/5.67	6.85/7.35	8.57/8.53	4.24/3.75	8.55/8.22
Psic./ No Psi. ^(c)	7.02/5.31(*)	7.40/6.60(*)	9.01/8.16(*)	3.79/4.38	8.98/8.02(*)
Edad1/2/ 3 ^(d)	6.24/5.67/6.13	6.96/6.98/7.75	8.66/8.39/8.38	3.99/4.27/5.38	8.53/8.20/8.63
Estu.1/2/3 ^(e)	5.31/5.90/6.67	6.00/6.88/7.19	6.85/8.57/8.85(*)	4.46/4.23/3.91	7.08/8.41/8.93(*)
Terror^(a)	5.55 (3.28)	8.05 (2.62)	8.91 82.03)	4.61 83.63)	8.59 (2.49)
Mujer/ Varón ^(b)	5.66/5.16	7.98/8.39	8.87/9.02	4.77/4.16	8.62/8.49
Psic./ No Psi. ^(c)	6.21/4.97(*)	8.26/7.91	9.22/8.63(*)	4.52/4.72	8.85/8.35
Edad1/2/ 3 ^(d)	5.86/4.67/4.75	8.11/8.06/8.00	8.93/8.96/8.50	4.60/4.80/5.13	8.68/8.51/8.00
Estu.1/2/3 ^(e)	4.54/5.48/5.85	6.38/8.03/8.41(*)	7.54/8.88/9.24(*)	6.15/4.53/4.66	7.54/8.58/8.83
Tímido^(a)	7.23 (2.79)	7.70 (2.93)	8.88 (1.99)	5.31 (3.47)	5.61 (3.57)
Mujer/ Varón ^(b)	7.41/6.65	7.62/7.96	8.95/8.67	5.32/5.37	5.90/4.67(*)
Psic./ No Psi. ^(c)	7.84/6.72(*)	8.06/7.40	9.34/8.48(*)	5.75/4.99	5.98/5.31
Edad1/2/ 3 ^(d)	7.53/6.22/7.88(*)	7.77/7.57/7.63	8.86/8.98/8.63	5.35/5.04/5.38	5.81/5.33/5.63
Estu.1/2/3 ^(e)	6.15/7.15/7.61	5.69/7.78/7.90(*)	7.85/8.80/9.25(*)	4.38/5.57/5.02	4.77/5.73/5.55
Tonto^(a)	6.76 (3.44)	6.69 (3.31)	8.51 (2.56)	2.56 (3.15)	2.14 (2.83)
Mujer/ Varón ^(b)	6.92/6.18	6.64/7.37	8.47/8.61	2.46/2.94	2.25/1.82
Psic./ No Psi. ^(c)	7.23/6.35	6.84/6.81	8.77/8.27	2.33/2.80	1.89/2.37
Edad1/2/ 3 ^(d)	7.16/5.67/7.57(*)	6.76/7.18/6.88	8.53/8.63/8.00	2.72/2.06/3.63	2.27/1.65/3.00
Estu.1/2/3 ^(e)	6.69/6.65/7.12	7.38/6.69/6.86	7.38/8.45/8.83	2.85/2.81/2.02	2.77/2.34/1.56
Torpe^(a)	6.55 (3.01)	7.17 (3.15)	8.96 (1.90)	4.96 (3.50)	5.11 (3.54)
Mujer/ Varón ^(b)	6.74/5.90	7.06/7.49	9.00/8.82	5.01/4.86	5.33/4.35
Psic./ No Psi. ^(c)	7.19/6.02(*)	7.32/7.04	9.22/8.73	5.26/4.71	4.46/4.78
Edad1/2/ 3 ^(d)	6.77/5.94/6.63	7.11/7.67/6.38	8.90/9.20/9.25	5.05/4.78/4.38	5.09/5.16/3.50
Estu.1/2/3 ^(e)	6.62/6.36/6.95	6.54/7.00/7.64	8.62/8.84/9.29	4.00/4.95/5.19	3.08/5.41/4.91
Trágico^(a)	5.10 (3.21)	7.19 (3.05)	8.60 (2.24)	7.07 (3.17)	6.62 (3.25)
Mujer/ Varón ^(b)	5.26/4.57	7.15/7.45	8.64/8.51	7.46/5.85(*)	6.70/6.37
Psic./ No Psi. ^(c)	5.74/4.57(*)	7.52/7.03	8.99/8.27(*)	7.54/6.68(*)	6.74/6.56
Edad1/2/ 3 ^(d)	5.35/4.16/6.25(*)	7.36/7.13/6.25	8.58/8.71/9.00	7.34/6.65/5.38	6.99/5.41/7.25(*)
Estu.1/2/3 ^(e)	5.23/4.88/5.53	5.00/7.36/7.30(*)	8.08/8.48/8.93	6.85/7.12/7.17	6.77/6.77/6.38
Triste^(a)	7.55 (2.71)	8.16 (2.71)	9.12 (1.86)	8.93 (2.01)	3.91 (3.40)
Mujer/ Varón ^(b)	7.74/6.96	8.18/8.08	9.14/9.04	9.13/8.31(*)	3.88/4.04
Psic./ No Psi. ^(c)	7.92/7.26	8.55/7.80(*)	9.45/8.83(*)	9.36/8.56(*)	3.54/4.25
Edad1/2/ 3 ^(d)	7.73/6.94/8.13	8.21/7.94/9.13	9.08/9.42/8.88	8.97/8.96/8.00	3.70/4.67/3.50
Estu.1/2/3 ^(e)	7.54/7.37/7.95	6.69/8.09/8.61	8.23/9.05/9.45	8.77/8.86/9.12	5.31/3.90/3.74

	Frec. de uso	Imaginación	Comprensión	Depresión	Ansiedad
Turbado ^(a)	3.50 (2.99)	5.52 (3.28)	7.94 (2.45)	5.63 (3.39)	5.99 (3.25)
Mujer/Varón ^(b)	3.40/3.78	5.45/5.84	8.04/7.67	5.48/6.06	6.18/5.33
Psic./No Psi. ^(c)	3.90/3.17	5.67/5.46	8.32/7.61(*)	5.86/5.45	6.51/5.50(*)
Edad1/2/ 3 ^(d)	3.57/3.08/4.50	5.42/5.69/7.38	7.77/8.57/7.75	5.69/5.57/6.13	6.11/5.67/5.13
Estu.1/2/3 ^(e)	3.92/ 3.26/3.97	5.38/5.30/6.00	7.23/7.69/8.61(*)	6.69/5.41/6.05	6.23/5.72/6.50
Vacilante ^(a)	4.09 (3.12)	6.35 (3.16)	7.89 (2.69)	4.39 (3.57)	5.10 (3.51)
Mujer/Varón ^(b)	4.01/4.37	6.23/6.75	7.84/8.04	4.32/4.63	5.08/5.16
Psic./No Psi. ^(c)	4.33/3.90(*)	6.38/6.37	8.35/7.47(*)	5.21/3.71(*)	5.51/4.75
Edad1/2/ 3 ^(d)	4.01/4.27/3.75	6.33/6.67/5.38	7.71/8.33/8.63	4.15/4.69/6.63	5.36/4.59/3.13
Estu.1/2/3 ^(e)	2.69/3.97/4.58	5.92/6.25/6.66	6.77/7.64/8.61(*)	4.31/4.19/4.97	3.31/5.31/5.14
Vértigo ^(a)	4.95 (3.33)	7.38 (3.05)	8.47 (2.45)	3.33 (3.22)	6.94 (3.47)
Mujer/Varón ^(b)	5.08/4.44	7.32/7.55	8.50/8.37	3.25/3.65	6.95/7.02
Psic./No Psi. ^(c)	5.37/4.57	7.74/7.05	8.86/8.12(*)	2.82/3.77(*)	7.47/6.53(*)
Edad1/2/ 3 ^(d)	5.15/4.29/5.71	7.47/7.35/7.13	8.54/8.45/8.25	3.27/3.42/5.00	7.24/6.24/6.00
Estu.1/2/3 ^(e)	4.85/4.93/5.02	6.62/7.52/7.09	6.62/8.45/8.84(*)	4.38/3.58/2.55	5.37/7.08/7.02
Víctima ^(a)	5.22 (3.07)	7.12 (2.98)	8.87 (1.90)	6.79 (3.45)	5.71 (3.56)
Mujer/Varón ^(b)	5.18/5.31	7.11/7.25	8.86/8.90	6.78/6.84	5.94/5.08
Psic./No Psi. ^(c)	6.00/4.56(*)	7.27/7.07	8.98/8.76	6.78/6.80	5.51/5.96
Edad1/2/ 3 ^(d)	5.43/4.47/6.25	7.23/7.16/6.75	8.78/9.02/9.25	6.76/7.16/7.00	5.85/5.71/3.75
Estu.1/2/3 ^(e)	5.31/5.11/5.42	5.77/7.33/6.93	8.62/8.81/9.02	6.85/6.71/7.02	6.77/5.88/5.00
Violento ^(a)	5.94 (3.24)	8.24 (2.56)	8.86 (2.22)	4.08 (3.34)	7.49 (2.92)
Mujer/Varón ^(b)	5.97/5.78	8.25/8.18	8.97/8.50	4.09/4.00	7.64/7.12
Psic./No Psi. ^(c)	6.78/5.22(*)	8.77/7.76(*)	9.41/8.38(*)	3.61/4.47	7.68/7.42
Edad1/2/ 3 ^(d)	6.24/5.14/5.75	8.21/8.27/8.88	8.82/9.04/9.25	3.93/4.82/3.63	7.69/7.14/7.50
Estu.1/2/3 ^(e)	4.25/5.91/6.34	7.42/8.15/8.53	8.17/8.63/9.49(*)	5.08/4.16/3.84	7.15/7.96/6.71(*)

(a) Se indica la media para la muestra total. La desviación típica está indicada entre paréntesis.

(b) Se indica las medias para las mujeres y los varones (en negrita).

(c) Se indica las medias para psicólogos y no psicólogos (en negrita). El asterisco (*) indica si existen diferencias significativas ($p < 0.005$).

(d) El grupo 1 corresponde a los sujetos entre 17 y 24 años; el grupo 2 (en negrita) a los sujetos entre 25 y 40 años; el grupo 3 (subrayado) a los sujetos entre 41 y 73 años. El asterisco (*) indica si existen diferencias significativas ($p < 0.005$).

(e) El grupo 1 corresponde a los estudios elementales; el grupo 2 (en negrita) a los estudios medios; y el grupo 3 (subrayado) a los estudios superiores. El asterisco (*) indica si existen diferencias significativas ($p < 0.005$).

**ANEXO 2:
LAS PALABRAS SEGÚN SU RELACIÓN CON
ANSIEDAD VERSUS DEPRESIÓN**

PALABRAS CON UNA MAYOR RELACIÓN CON ANSIEDAD(*)	PALABRAS CON UNA MAYOR RELACIÓN CON DEPRESIÓN(*)	SIN DIFERENCIAS ANSIEDAD-vs. DEPRESIÓN
<p>accidente agitado agonizante alarmado amenaza amenazado ansioso aprensión arriesgado asustado aterrorizado daño defensivo desconfiado desesperado dubitativo embarazoso emocionado hipocondría hostil incómodo inmaduro inoportuno inquieto insomnio intranquilo irritable</p> <p>mareo miedo miedoso molesto nervioso odioso palpitación pánico peligro perplejo perseguido preocupación preocupado problemático rubor sobresalto sofoco sudor sudoroso taquicardia tembloroso tensión tenso terror vacilante vértigo violento</p>	<p>achacoso cansado débil deficiente deprimido desamparado desanimado desastre descuidado desdeñado desdichado desgracia desinterés despreciable desprecio dolorido enfermizo enfermo entumecido estúpido fatiga fracasado fracaso herido humillación ignorante</p> <p>imperfecto inapetente incapacidad incapaz incompetente indefenso inepto inferior insatisfecho inútil lento llanto lloroso muerte mutilado patético peor pobre rechazado ridículo solitario suicida suicidio tonto triste víctima</p>	<p>avergonzado castigo catástrofe criticado culpable inadecuado indeciso inestabilidad inseguro mareado molestia ofendido paralizado simple tímido torpe trágico turbado</p>

(*) La "t" de Student para muestras relacionadas era significativa al menos con una $p < 0.05$